
Flor.
18.
R. Friedländer
& Sohn, Berlin

A. Bielefeld's
Hofbuchhandlung
Carlsruhe.



O. H. Borries

F. Svendsen. 1-1883.

The circumstances surrounding the publication of the "Prodromus" and the publication date, July 1788, are discussed by Stearn (Taxon 29: 1-13. 1980).

NOVA
GENERA & SPECIES
PLANTARUM.

Prodr. Veg. Ind. Occ. 1–152 + index

QK
225
S96X
1788
Bot. H-C

NOVA GENERA & SPECIES PLANTARUM

SEU

PRODROMUS

DESCRIPTIONUM VEGETABILIUM,
MAXIMAM PARTEM INCOGNITORUM
QUÆ
SUB ITINERE IN INDIAM OCCIDENTALEM
ANNIS 1783—87
DIGESSIT

OLOF SWARTZ. M. D.

A. S. HITCHCOCK.

SMITHSONIAN
NOV 28 1989
LIBRARIES

HOLMIÆ, UPSALIÆ, & ABOÆ,
In Bibliopoliis Acad. M. SWEDERI.
MDCCLXXXVIII.

1788

Many ſhall run to and fro, and Knowledge ſhall be increaſed.

DAN. XII.

Dr Gærtner.

PRAEFATIO.

India occidentalis, ſive Inſulæ ſic dictæ Antillicæ, non minus qvam reliquæ inter Tropicos ſitæ regiones, inſignem admodum Vegetabilium ferunt proventum. Qvorum ingens omnino numerus, diligentisſima multorum diverſis temporibus facta perqviſitione, dudum eſt inveſtigatus. Sed & ſic plurima reſtare tamen futuris Naturæ ſcrutatoribus reſervata, fatebuntur periti rerum exiſtimatores; licet trecenti prope effluxerint jam anni, ex quo novum detexerunt Europæi orbem.

Illos inter, qui enodandæ harum regionum Hiſtoriæ naturali laudabili niſu operam ſuam conſecrare voluerunt, commemorandi ſunt præcipue Rochefort, Labat, Thevetus, Linocier, Plumier & Sloane.

Facere non posſumus, qvin magnopere admiremur ſtupendam illam adcurationem, ſollertiam & ſagacitatem in cunctis, quæ Pater Plumier elucubravit, operibus conſpicuam. Quibus profecto haud poterit carere, qui Naturæ, in hiſce orbis tractibus, theſauros felici cum ſuccesſu indagare ſibi propoſuerit. Celebris hujus Auctoris *Filices*, *plantæ Americanæ & Icones per beat. Burmannum editæ*, 900 prope continent Vegetabilium Figuras, quæ prius tantum non omnia fuerunt incognita; ingentem illam ut ſilentio prætereamus Botanicarum multitudinem figurarum, quæ publicam lucem nunqvam adſpexerunt.

INDEFESSO ſtudio, jam ſua dudum ætate conatus eſt Cel. SLOANE ea colligere omnia, quæ ad Hiſtoriam naturalem Jamaicæ amplificandam pertinerent. Luculentum ſatis huic rei perhibet teſtimonium Itineris, qvod ad hanc Inſulam inſtituerat, deſcriptio, *) figuras 546 exhibens. Quæ, utut minoris magna ex parte momenti, honorabilem tamen Auctori inter *Fundatores* Botanicos **) vindicant locum.

EUM poſteriori tempore excepit Cel. BROWNE in exploranda Naturali hujus Inſulæ Hiſtoria. Cui rei etiam omnem, qvem poterat, impendit laborem & induſtriam. In ſyſtematicum ordinem cuncta diſpeſcuit, inventarum ſimul a ſe Plantarum egregias addens figuras, eo majori in pretio habendas, qvod eas artificioſisſimis Incliti illius EHRETI manibus æri incidendas curaverat. Aſt horum obſervationes Duumvirorum ad Jamaicam ſolam inprimis ſpectabant, quæ non niſi exiguam conſtituit Archipelagi Indiæ occidentalis portionem.

QUÆ antea peragraverat Cel. PLUMIER loca, eorum plurima deinde inviſit celebratisſimus Ille JACQUIN. Qvi qvo ingenuo mentis ardore adamatæ a ſe Scientiæ auctibus provehendis invigilaverit, indicio esſe potuerunt, *Enumeratio Plantarum Americanarum*, *Selectarum ſtirpium Americanarum Hiſtoria*, *Obſervationes Botanicæ*, & q. ſ. r.

AB hac mundi parte & ex his oris, ego quoque haud ita pridem redii, non exiguis Floræ divitiis onu-

*) Voyage to Jamaica etc. 1707.

**) Linn. phil. bot.

nuſtus. De eo lætus, quod licuerit mihi præſtantium adeo Scientiæ Naturalis cultorum ſidis inſiſtere veſtigiis, multa ab iis relicta colligere, & perfectius luſtrare, quæ illis adcurate examinandi deſuit occaſio, propero jam Orbi Botanico exponere fructum jucundi mihi plus ſimplici laboris. Qvinque omnino præterlapſi ſunt anni, ex quo in Floræ, tropicos inter habitantis adyta intromitti mihi dabatur. Inſulæ Antillicæ diverſo, una poſt alteram, tempore a me freqventabantur, Jamaica, Cuba, Hiſpaniola: quarum tamen iſta maximam mihi videbatur mereri animi attentionem.

Est enim hæc ipſa Inſula, ubi plurimum temporis ſub hac mea profectione exegi, cujusque interiores quoque regiones montanis in tractibus ſitas penetravi, immo ea luſtravi loca, qvæ aditu non modo perqvam difficilia ſed et prorſus invia exiſtimata fuerunt. Hiſce in locis plures longe eosque diverſos Naturæ fetus cognoſcere mihi licuit, qvam viderant Anteceſſores mei, & ut in temperato magis Climate, minusque adeo torrentibus ſolis caloribus expoſitus, aliqua cum commoditate inqviſitiones meas perſeqvi potui; ſæpe etiam jucunda quorundam Anglorum, ibi verſantium, ſocietate ſtipatus, quibus innoteſcendi propenſaque illorum mihi comparandi ſtudia, qvod occaſio ſeſe obtulerit, id vero gratum mihi & opportunum accidit.

Insigni, poſt brevem adeo in illis plagis commorationem, collectione prope 850 novarum ſpecierum Vegetabilium ditatus Angliam repetebam A:o. 1786. Magna hujus collectionis pars adcuratius jam digerebatur, dum liber mihi pateret aditus ad præclarum

rum Muſeum Ill. JOSEPHI BANKS Baroneti, Societatis Regiæ Anglicanæ Præſidis, qvi nec ipſe ſuam mihi denegabat benevolentiam, qvin ſuis me conſiliis, ſua inſpectione juvare dignaretur. Non poterunt immortales Perilluſtris hujus Viri digne ſatis celebrari laudes. Perſpecta jam dudum habet Litteratus Orbis maxima Illius promerita, incredibile in Scientiam Naturalem penitus ſibi dilectam ſtudium, animumque illum generoſum, quo Scientiarum complectitur Cultores. Satis ſit dixiſſe, Orbi ſero adpariturum, qvi Illi par inveniatur. Indulgenti Illius permisſu, dum Londini verſabar, auctæ ſunt Collectiones meæ, atque in eum accreverunt numerum, qvem præſens hic ſiſtit Prodromus. Conſtant hæ accesſiones Vegetabilibus, quæ ex diverſis locis Indiæ Occidentalis jam antea Angliam fuerant transmisſa, ibique ſtatim a def. Doct SOLANDRO deſcripta, & eorum exempla in Muſeum illata. Horum in cenſu, unum quoque et alterum novum plane occurrit Genus, quorum ſuo quodque loco aſteriſco (*) notandum duxi.

NEQUE intermittere fas mihi fuerit, qvin grata commemoratione profitear, Popularem meum honoratisſimum, Phil. Mag. JON. DRYANDER, Bibliothecæ Soc. Reg. Lond. Præfectum, cujus excellens in Botanicis ſcientiis ceterisque Hiſtoriæ Nat. partibus cognitio eſt notisſima, haud parum mihi adtuliſſe adjumenti in perluſtrandis Vegetabilibus Muſei Bankſiani

QUÆ ut nova a me edita ſunt Vegetabilia, ea certius etiam ab omnibus aliis fuerunt diſtincta, idque eo exactius, quod anſa mihi ſuppeditabatur illa cum reliquiis Linnæanis comparandi, quas poſtquam Svecia perdidit, eo intentiori cura ſervat Anglia.

AD

Ad excludendas Claſses *Monoeciæ Diæciæ* & *Polygamiæ*, tam exemplo Cel. Prof. & Eqvit. Thunberg, quam mea ipſius experientia impulſus ſum. Qvum in calidioribus commorarer Zonis, magis ſenſim magisque mihi conſtare cœpit, Arborum pleraſque eſſe Polygamas, & multas Hermaphroditarum Linnei ſæpe floribus Maſculinis & Femineis ſeorſum gaudere. Quæ omnia ſatis oſtendunt reductionem harum Claſſium fieri non poſſe modo, ſed & oportere. Quod ad *Gynandriam* attinet, retinendas judicavi præſertim *Orchideas* utpote quæ Claſſem æque profecto diſtinctam efficere videntur, ac *Didynamæ Tetradynamæ* & *Monadelphæ*. Multiplex & varius, quem flores earum præ ſe ferunt, habitus, adhuc qvidem Genera totius hujus Claſſis valde reddidit incerta & vaga; ſed ſperandum fuerit, detectis poſthac pluribus ſpeciebus, fore ut ea facilius, certiusque explicari queant.

Pluribus in locis Syſtemati conveniens inveni, & cauſſas ſufficientes mihi fuiſſe exiſtimavi, cur unum alterumque reducerem Genus ex Americanis, quæ olim in Generibus plantarum determinaverat Linneus, poſtquam mihi licuit adcuratius illa contemplari, eorumque cum cognatis comparationem inſtituere. Pari ratione etiam neceſſarium interdum duxi diſtincta determinare Genera ex quibusdam ſpeciebus cognitorum antea Generum, quum plures offendi, quæ cum illis conveniunt.

Pauca aliorum Auctorum, e. g. Jacqvini, Brownei, Aubleti &c. nova genera necdum Syſtemati Vegetabilium inſerta, de integro determinavi, & in ſuum quodque locum digeſſi, poſtquam adcurate perluſtrata

ta

ta fuerunt & deſcripta. Horum cuique nomen illius appoſui, qui ea primus detexiſſe videatur.

Hunc itaque libellum eſſe volui *Prodromum futuri Operis*, quod integras continebit Deſcriptiones harum ſpecierum, quæque in publicum prodibunt, qvam primum figuræ, qvibus illuſtrari debent, fuerint perfectæ.

Prius vero Amatoribus ſcientiæ me traditurum ſpero Characteres Naturales eorum Generum, quæ tanqvam nova hic adducta conſpiciuntur; ut et factas meo ſub itinere obſervationes Botanicas. Hoc interim, quod jam exhibetur, ſpecimen inſervire poterit ſupplementi loco Editionis poſtremæ Syſtematis Vegetabilium.

NOVA GENERA.

CHARACTERES GENERUM ESSENTIALES.

I. BROSIMUM. (MONANDRIA *Monogynia.*)

Dioic. ♂. *Amentum* globoſum undique tectum ſqvamis peltatis. *Cal.* O. *Cor.* O. *Antheræ* bilamellatæ.

♀. *Amentum* maris. *Stylus* unicus, 2-fidus. *Drupa* 1-ſperma.

II. LACISTEMA. (MONANDRIA *Digynia.* ante *Coriſpermum.*)

Amentum. *Cor.* 4-partita. *Filamentum* bifidum.

III. LITHOPHILA. (DIANDRIA *Monogynia.* *Flores inferi tripetali.*)

Cal. triphyllus. *Cor.* tripetala. *Nectarium* diphyllum.

IV. THOUINIA. (DIANDRIA *Monogynia.* *Flores inferi 4-petali.*)

Cal. 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Antheræ* ſeſſiles.

V. XIPHIDIUM. * (TRIANDRIA *monogynia.* *inter Wachendorf. & Commelinam.*)

Cor. 6-petala, æqvalis. *Cal.* O.

VI. SCLERIA. (TRIANDRIA *Monogynia.* pone *Schoenum.*)

Monoic. ♂. *Spiculæ* multifloræ.

♀. *Spiculæ* unifloræ. *Semen* ſuboſseum, globoſum.

VII. LEERSIA. (TRIANDRIA *Monogynia.* *poſt Saccharum.*)

Cal. O. *Cor.* bivalvis, clauſa.

VIII. CHLORIS. (TRIANDRIA *Monogynia.* ante *Airam.*)

Polygam. *Cal.* communis bivalvis, biflorus, floſculo *Hermaphrodito* ſeſſili, altero *maſculo* pedicellato.

A IX.

IX. PICRAMNIA. (Triandria *Digynia.* *pone Oſiridem.*)

Dioic. ♂ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* tripetala.
☿ *Cal.* & *Cor.* maris.
Bacca 2-locularis.

X. ERNODEA. (Tetrandria *Monogynia.* inter *Ixoram* & *Peteſiam.*)

Cor. hypocrateriformis. *Cal.* 4-dentatus.
Bacca 2-locularis. *Sem.* ſolitaria.

XI. HOFFMANNIA. (Tetrandria *Monogynia* poſt *Peteſiam.*)

Cor. hypocrateriformis, 4-partita.
Cal. 4-dentatus. *Filam.* O.
Bacca bilocularis, polyſperma.

XII. COCCOSIPSILUM. (Tetrandria *Monogynia.* ante *Hedyotidem.*)

Cor. infundibuliformis. *Cal.* 4-part.
Bacca inflata 2-locularis, polyſperma.

XIII. WALLENIA. (Tetrandria *Monogynia.* ante *Callicarpam.*)

Cor. tubuloſa. *Cal.* 4-fidus.
Bacca 1-ſperma.

XIV. LABATIA. (Tetrandria *Monogynia.* inter *Pæneam* & *Blæriam.*)

Cor. ſubcampanulata. *Cal.* 4-phyllus.
Capſula 4-locularis. *Sem.* ſolitaria.

XV. BOEHMERIA. (Tetrandria *Monogynia* *Fl. incompl. inferi.*)

Monoic. ♂. *Cal.* 4. partitus.
♀. *Cal.* O. *Stylus* 1.
Sem. 1.

XVI. SCHEFFERIA. (Tetrandria *Digynia.*)

Dioic. ♂. *Cor.* 4-petala l. nulla.
Cal. 4-5 phyllus.
♀. *Cor.* 4 petala l. nulla.
Cal. 4—5 partitus.
Bacca 2-locularis.

XVII.

XVII. CRANTZIA. (TETRANDRIA *Trigynia.*)
Monoic. ♂. *Cor.* O. *Cal.* 4_phyllus.
♀. *Cor.* O. *Cal.* 5_phyllus.
Caps. 3_cornis, 3_locularis.

XVIII. ARGYTHAMNIA. (TETRANDRIA *Trigynia.* pone *Ciccam.*)
♂. *Cor.* 4_petala. *Cal.* 4_phyll.
Monoic. ♀. *Cor.* O. *Cal.* 5_phyllus.
Styli dichotomi. *Caps.* 3_cocca.

XIX. BUMELIA. (PENTANDRIA *Monogynia.* inter *Jaqviniam* & *Laugeriam.*)
Drupa 1_ſperma. *Cor.* 5_fida.
nectario 5_phyllo.

XX. ARDISIA. (PENTANDRIA *Monogynia.* ante *Varroniam.*)
Drupa monoſperma. *Cor.* reflexa.
Stigma ſimplex.

XXI. SOLANDRA. (PENTANDRIA *Monogynia.* inter *Lycium* & *Menain.*)
Bacca 4_locularis, polyſperma.
Calyx rumpens. *Cor.* maxima.

XXII. CEPHAELIS. (PENTANDRIA *Monogynia.* inter *Morindam* & *Pſychotriam.*)
Bacca 2_ſperma. *Cor.* tubuloſa.
Receptaculum paleaceum.

XXIII. SABICEA. (PENTANDRIA *Monogynia.* inter *Hamelliam* & *Erithalem.*)
Bacca 5_locularis, polyſperma.
Cor. infundibulif. *Stigma* 5_part.
Involucrum 4_fidum.

XXIV. RUYSCHIA* (PENTANDRIA *Monogynia.* pone *Vitin.*)
Fructus polyſpermus. *Cor.* reflexa.
Stylus O. *Cal.* 5_phyllus.

XXV. DICHONDRA. (PENTANDRIA *Digynia.* pone *Hydroleam.*)
Caps. 2 monoſpermæ.
Cor. rotata, 5_partita.

XXVI. ROCHEFORTIA. (PENTANDRIA *Digynia.* inter *Schreberam* & *Steridem.*)
Fructus bilocularis, polyſpermus. *Cor.* infundibuliformis, fauce aperta.

XXVII. MICROTEA.* (PENTANDRIA *Digynia.* ante *Salſolam.*)
Semen unicum ſubgloboſum, cortice coriaceo echinato tectum. *Cal.* 5-phyllus, patens.

XXVIII. HEPETIS.* (HEXANDRIA *Monogynia.* pone *Tillandſiam.*)
Cor. 3-petala. *Cal.* 3-partitus. *Caps.* ſemiſupera. *Sem.* mutica.

XXIX. THRINAX. (HEXANDRIA *Monogynia.* *Flores incompleti.*)
Cal. 6-dentatus.
Stigma emarginatum.
Bacca 1-ſperma, nuda.

XXX. HEDWIGIA. (OCTANDRIA *Monogynia.* pone *Amyridem.*)
Cor. 4-fida. *Cal.* 4-dentatus.
Capſ. 3-locularis.

XXXI. HYPELATE. (OCTANDRIA *Monogynia.* pone *Melicoccam.*)
Polyg. ☿. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Drupa* 1-ſperma. *Stigma* deflexum.
♂. ut in *Hermaphrodito.*

XXXII. VALENTINIA. (OCTANDRIA *Monogynia.* poſt *Dodonæam.*)
Cal. 5-partitus, coloratus, patens.
Caps. baccata, 4-ſperma, pulpoſa.

XXXIII. PETALOMA. (DECANDRIA *Monogynia.* pone *Murrayam.*)
Petala 5 calyci inſerta.
Cal. cyathi formis.
Bacca 1-locularis.

XXXIV. CALYPTRANTHES. (ICOSANDRIA *Monogynia.* poſt *Myrtum.*)

Cal. truncatus, operculatus.
Cor. O. *Bacca* 1-4-ſperma.

XXXV. POSSIRA. (POLYANDRIA *Monogynia.* poſt *Marcgraviam.*)

Cal. 4-phyllus (partitus).
Petalum unicum, laterale, ungviculatum.
Legumen 1-loc. 2-valve.

XXXVI. APEIBA.* (POLYANDRIA *Monogynia.* inter *Ciſtum* & *Corchorum.*)

Caps. multilocularis, echinata: *loculis* polyſpermis.
Cal. 5-phyllus.

XXXVII. MARILA.* (POLYANDRIA *Monogynia.* inter *Ciſtum* & *Corchorum.*)

Capſ. 4-locularis. *Cal.* 5-phyllus.
Stigma ſimplex.

XXXVIII. EROTEUM (POLYANDRIA *Monogynia.* inter *Tiliam* & *Muntingiam.*)

Bacca exſucca, 3 loc. polyſperma.
Cal. 5-phyllus. *Stylus* 3-fidus.

XXXIX. LEGNOTIS. (POLYANDRIA *Monogynia.* inter *Muntingiam* & *Elæocarpum.*)

Capſ. 3-locularis. *Petala* receptaculo inſerta, lacera.

XL. LIGHTFOOTIA. (POLYANDRIA *Monogynia.* ante *Laetiam.*)

Polygam. ☿. *Cal.* 4-phyllus. *Stigma* ſeſſile.
Bacca umbilicata, 3-6-ſperma.
♂-♀-hermaphroditi.

XLI. HEDYOSMUM. (POLYANDRIA *Monogynia.* *Apetali.*)

Monoic. ♂. *Amentum* antheris ſeſſilibus tectum.
♀. *Cal.* 3-dentatus, ſuperus.
Stylus triqueter. *Bacca* 3-gona, 1-ſperma.

XLII. ACIDOTON. (Polyandria *Monogynia.* *Apetali.*)

Dioic. ♂. *Cal.* 5_phyllus.
Monoic. *Stam.* receptaculo globoſo affixa.
♀. *Cal.* 6_phyllus. *Stylus* 3_fidus.
Caps. tricocca.

XLIII. HOMALIUM. (Polyandria *Trigynia.* ante *Delphinium.*)

Cal. 6_7_partitus. *Pet.* 7.
Stam. 21. per 3 aggregata.

XLIV. TANÆCIUM. (Didynamia *Angioſpermia* ante *Cal.* 2_*fidos.*)

Bacca corticoſa, maxima.
Cor. tubuloſa, ſubæqvalis, 5_fida.
Rudimentum fil. 5_ti.

XLV. TAMONEA. (Didynamia *Angioſpermia.* pone *Pedalium.*)

Nux. 4_locularis. *Cal.* ariſtatus.

XLVI. GYMNANTHES. (Monadelphia *Triandria.* pone *Iuniperum.*)

Monoic. ♂. *Amentum* nudum.
Dioic. *Stam.* pedicelli 3_partiti l. 3_chotomi, antheriferi.
♀. *Amentum* l. *Germen* pedicellatum.
Stylus 3_fidus. *Caps.* 3_cocca.

XLVII. MYRISTICA. (Monadelphia *Triandria.*)

Dioic. ♂. *Cal.* 3_fidus. *Cor.* O.
Filamentum columnare.
♀. *Cal.* 3_fidus. *Cor.* O.
Caps. drupacea, 2_valvis.

XLVIII. OCHROMA. (Monadelphia *Petnandria.* pone *Melochiam.*)

1_gyna. *Caps.* 5_locularis.
Cal. 2_plex. *Antheræ* anfractuoſæ, connatæ.

XLIX. ALCHORNEA.* (Monadelphia *Octandria.*)

Dioic. ♂. *Cal.* 3_5_phyllus. *Cor.* O.
♀. *Cal.* 5_dentatus *Cor.* O.
Stylus 2_partitus.
Capſula dicocca.

ACHA-

L. ACHANIA. * (Monadelphia *Polyandria.* inter *Hibiſcum* & *Althæam.*)
Monogyna. *Cal.* exter. polyphyllus. *Bacca* 5-ſperma.

LI. MYRODIA. * (Monadelphia *Polyandria.* ante *Meſuam.*)
Monogyna. *Cal.* ſimplex, 1-phyllus. *Petala* 5.
Drupa ſicca, 2-ſperma.

LII. AMERIMNON. (Diadelphia *Decandria.* pone *Pterocarpum.*)
Legumen compreſſo-foliaceum, 2-valve, dehiſcens.
Cal. bilabiatus.

LIII. TERAMNUS. (Diadelphia *Decandria.* pone *Amorpham.*)
Carina minima, calyce recondita.
Stamina alterna, 5-ſterilia.

LIV. STYLOSANTHES. (Diadelphia *Decandria.* pone *Æſchynomenen.*)
Legumen 2-articulatum, hamatum.
Calyx tubulatus, longiſsimus, corollifer.

LV. LAVENIA.* (Syngenesia *Pol. æqvalis.* inter *Spilanthum* & *Ageratum.*)
Rec. nudum. *Pappus* 3-ariſtatus glanduloſus.
Cal. ſubæqvalis.

LVI. TRIXIS. (Syngenesia *Pol. neceſſaria* pone *Polymniam.*)
Rec. paleaceum. *Pappus* nullus. *Sem.* apice villoſa.
Corollulæ radii 3-fidæ.

LVII. TETRANTHUS. (Syngenesia *Pol. ſegregata.* poſt *Echinopen.*)
Cal. communis 4-florus. *Perianth.* 1-phyllum.
Sem. coronata.
Polygamia æqvalis.

RO-

LVIII. ROLANDRA. (SYNGENESIA *Pol. ſegregata*, poſt *Echinopen*)
Capitata. Perianth. 2-valve, uniflorum.
Pappus nullus.
Polygamia æqvalis.

LIX. MALAXIS. (GYNANDRIA *Diandria*. pone *Ophrydem*.)
Nectarium 1-phyllum, concavum, cordatum, *genitalia* in medio fovens.

LX. CRANICHIS. (GYNANDRIA *Diandria*. poſt *Arethuſam*.)
Nectarium galeatum.

LXI. MARATTIA. (CRYPTOGAMIA *Filices*. *Fructif. frondoſæ* ante *Acroſtichum*.)
Capſulæ (fructificat.) multiloculares. *Loculis* ſuperne dehiſcentibus.

NOVÆ
SPECIES.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

AMOMUM.

Sylueſtre. 2—3. A. ſcapo nudo, ſpica elongata bracteis oblongis ventricoſis, foliis lato-lanceolatis. *Sloan. jam.* 61. *hiſt.* 1 *p.* 165. *t.* 105. *f.* 2. Amomum 2. *Brown. jam.* 113. *Jamaica.* ♃.

COSTUS.

glabratus. 2. C. foliis utrinque glabris, ſpica pauciflora, ſquamis apice foliaceis, ſummis faſtigiatis. * *Coſtus Linn. H. Cliff.* 2. *deſcr.* Planta. *Mer. Sur. t.* 36. *India occidentalis.* ♃

ſpicatus. 3. C. foliis utrinque glabris, ſpica multiflora ſubouata, arcte imbricata: ſquamis ouatis ſimplicibus. Alpinia ſpicata. *Murr. S. V. p.* 51. 2. *Jacqu. am.* 11. *t.* 1. *Inſulæ caribææ.* ♃.

arabicus. 1. C. *foliis ſubtus ſericeis.* C. *arabicus Linn.*

ALPINIA.

Occidentalis. 2. A. racemo radicali compoſito erecto, nectario apice emarginato, capſulis trilocularibus, foliis lanceolato-ouatis glaberrimis. *Jamaica, Domingo, &c.* ♃.

racemoſa. 1. A. *racemo terminali ſpicato, floribus alternis, nectarii labio trifido; foliis oblongis acuminatis.* *A. racemoſa Linn.*

CYN-

CYNOMORIUM.

Jamaicenſe 2. C. ſtipite ſquamoſo, amento elongato, ſquamis imbricatis dimidiatis rhomboideis. Cynomorium. *Brown. jam.* 334.
Jamaica, paraſitica.

Cayanenſe. 3. C. ſtipite nudo, amento ſubgloboſo, ſquamis ſubrotundis peltatis. *
Cayenna, paraſitica.

BROSIMUM.

DIOIC. ♂. *Cal. Amentum* globoſum, undique tectum ſqvamis orbiculatis peltatis.
Cor. O.
Filamenta ſolitaria inter ſquamas erumpentia.
♀. *Cal.*. *Amentum* maris.
Cor. O. *Stylus* unicus, bifidus.
Bacca monoſperma.

Alicaſtrum 1. B. foliis ouato-lanceolatis perennantibus, amentis globoſis pedicellatis ſolitariis axillaribus, fructu corticoſo. *Alicaſtrum Brown. jam.* 372.

ſpurium. 2. B. foliis lanceolato-ovatis, acuminatis, amentis pedicellatis ovatis axillaribus geminis, fructu molli. *Arbor* foliis oblongis glabris alternis. *Brown. jam.* 369. 8.
Jamaica. ♄

DIGYNIA.

LACISTEMA.

Cal. Amenti ſquama *Cor.* quadripartita.
Filamentum bifidum.
Bacca pedicellata, monoſperma.
(ante *Coriſpermum.*)

Myricoides LACISTEMA.
Piper aggregatum, *Berg. Act. Helv.* 7. *p.* 131. *t. x.*
Jamaica.

CLAS-

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

CHIONANTHUS.

compacta. 1-2. C. paniculis trichotomis, ultimis floribus ſubcapitatis, calycibus villoſis, foliis lanceolato-oblongis; antheris acuminatis. *
Inſulæ caribææ ♄.

incraſſata. 1-2. C. ? paniculis ramis decusſatis faſtigiatisve, ultimis 3-floris, corollis tetragonis, laciniis erectis incrasſatis, foliis oblongis conſiſtentibus.
Iamaica. ♄.

IUSTICIA.

nitida. 6-7. I. fruticoſa, foliis ellipticis acuminatis, racemis ſpicæ-formibus verticillatis, bracteis minutis, pedicellis calycibusque glabris. (antheris *paralellis*) * Juſticia nitida *Jacq. am.* 5. *Inſulæ caribææ.* ♄.

armata. 8-9. I. fruticoſa, aculeata, foliis oblongis emarginatis coriaceis nitidis.
Jamaica. ♄.

acicularis. 8-9. I. fruticoſa, diffuſa, ſpinoſa, ſpinis ſetaceis, floribus pedunculatis axillaribus ſolitariis.
Jamaica ♄.

pectoralis. 18-19. I. (*Dianthera* L.) caule herbaceo adſcendente, foliis lanceolato-linearibus, ſpicis terminalibus ſubpaniculatis.
J. pectoralis. *Jacq. am.* 3. *Tab.* 3.
Dianthera 3. *Brown. jam.* 118. 3.
India occidentalis ♃.

reptans 18-19. I. (*Dianthera L.*) caule herbaceo repente foliis obtuſis, ſpica terminali indiviſo.
Domingo. ☉.

humi-

humifuſa. 18–19. I. (*Dianthera.* L.) caule herbaceo decumbente foliis ovatis cordatisque, ſpicis umbellatis. *Jamaica.* ☉.

nemoroſa. 21–22. I. caule herbaceo tetragono erectiuſculo, foliis ouato-lanceolatis, ſpicis ovatis. *Jamaica*, *Hiſpaniola.* ♃.

GRATIOLA.

repens. 2–3. G. foliis ouatis, caule repente, calyce 5-phyllo, ſtylo bifido. *Jamaica.*

UTRICULARIA.

obtuſa. 4–5. U. nectario inflexo obtuſo ſubemarginato. Utricularia 1. *Brown. jam.* 119. *Jamaica.*

SALVIA.

occidentalis. 6–7. S. foliis ouatis ſerratis, ſpicis laxis, bracteis cordatis ſubtrifloris. Salvia 1. *Brown. jam.* 117. *India occidentalis.* ♃.

tenella. 7–8. S. foliis cordatis, caule filiformi repenti, ſpicis adſcendentibus. *Jamaica.* ☉.

LITOPHILA.

Cayx triphyllus. *Corolla* tripetala.
Nectarium diphyllum.
(*Flores inferi*, *tripetali.*)

muſcoides 1. LITHOPHILA. *Navaza.*

THOUINIA.

Cal. quadridentatus. *Cor.* quadripetala.
Antherae petala duo oppoſita baſi connectentes.
Bacca bilocularis. *Loc.* 2-ſpermibus.
(*Flores inferi* 4 *petali.*)

ligu-

liguſtrina 2. THOUINIA foliis lanceolatis, paniculis terminalibus, floribus erectis.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

TRIGYNIA.

PIPER.

diſcolor. 3–4. P. foliis lato-ovatis 5-nerviis glaberrimis, poſtice diſcoloribus, ſpicis laxioribus, floſculis remotioribus.
Jamaica. ♄.

macrophyllum. 9–10. P. foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris, petiolis appendiculatis, caule lævi.
Piper 4. *Brown. jam.* 122.
Jamaica. ♄.

geniculatum. 9–10 P. foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris, caule ramisque geniculatis.
Jamaica. ♄.

verrucoſum. 9–10. P. arboreſcens, foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris coriaceis, caule ramisque verrucoſis.
Sloan. cat. 25. h. 1. 135.
Piper arboreum. *Aubl. gvian.* –
India occidentalis. ♄.

hiſpidum. 9–10. P. foliis ouatis acuminatis obliquis hirſutis rugoſis, nervis alternis, ſpicis erectis.
Jamaica. ♄.

nitidum. 9–10. P. foliis lanceolato-ovatis, baſi obliquis glabris nitidis.
Jamaica. ♄.

alpinum. 10–11. P. herbaceum, caule erecto ſimpliciuſculo, foliis ouato-ſubrotundis acutis, ſubtus aveniis, ſpicis axillaribus.
Jamaica ♃.

hiſpidulum. 10–11. P. herbaceum, erectiuſculum, foliis ſubrotundis petiolatis tenuiſſimis, ſuperne hirtis.
Jamaica. ☉.

tenellum. 10–11. P. herbaceum, ſimplex decumbens, foliis diſtichis ouatis aueniis, margine ciliatis, ſpica adſcendenti.
Jamaica ☉.

amplexicaule. 11–12. P. ſubherbaceum, foliis lanceolato-ovatis amplexicaulibus nervoſis carnoſis, caule erecto ſimplici.
India occidentalis ♃.

glabellum. 16–17. P. herbaceum, foliis ouatis acuminatis, caule declinato radicante ramoſisſimo.
Jamaica.

ſcandens. 16–17. P. herbaceum, foliis ouatis acutis, caule radicante ſimplici adſcendenti.
Jamaica.

ſerpens. 12–14. P. herbaceum, foliis ſubrotundo-acutis planis diſcoloribus, ca ule rpente.
Jamaica.

cordifolium. 13.–14 P. herbaceum, foliis obuerſe cordatis petiolatis, plano-convexis carnoſis, caule repente.
Jamaica.

nummularifolium. 13–14. P. herbaceum, foliis orbiculatis convexoconcavis, caule filiformi repente radicante.
Jamaica.

filiforme. 19–20. P. herbaceum, foliis linearibus obtuſis, ſummis verticillatis, caule filiformi repenti.
Jamaica.

ſtellatum. 19–20. P. herbaceum, foliis verticillatis oblongis acuminatis trinerviis glabris, caule erecto.
Jamaica.

CLAS-

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

CAMOCLADIA.

Jlicifolia. 3. C. foliolis angulato-ſpinoſis. *
Jlex dodonæa, *Spec. pl.* 2. 182.
L. Mant. 333. Dodonæa. *Plum. gen.* 20. *ic.* 118. *f.* 1.
India occidentalis, *Antigua.* ♄.

HIPPOCRATEA.

comoſa. 2. H. paniculis comoſis, pedunculis multifidis capillaribus, foliis ovatis acuminatis integris.
Hiſpaniola. ♄.

volubilis. 1. H. *racemis corymboſis, foliis ovato-lanceolatis ſerratis.* H. volubilis. *Linn.*

XIPHIDIUM.

Calyx nullus.
Corolla 6 petala, æqualis, infera.
Capſula 3-locularis, polyſperma.
(inter *Moræam* & *Wachendorfiam.*)

floribundum. XIPHIDIUM. *
a. *Loefl. it.* 179.
b. *Aubl. Guian. p.* 33. *t.* 11.
Antillæ, St-Chriſtophori. &c. ♃.

SISYRINCHIUM.

latifolium. 3. S. foliis enſiformibus nervoſis, plicatis.
Ixia foliis enſiformibus plicatis glabris caule ramoſo. *Plum. ic.* 35. *t.* 46. *f.* 2.
India occidentalis. ♃.

CAREX.

hamata 5-6. C. ſpica ſimplici androgyna lineari, ſuperne maſcula, femineis ariſtatis; ariſtis apice uncinatis æqualibus.
Iamaica.

SCLERIA.

MONOIC. MASC. *Cal. Gluma.* 2-6 valvis multiflora mutica.
Cor. Glumæ muticæ. *Fil.* 1-3.
FEM. *Cal. Gluma* 2 6 valvis uniflora mutica. *Stigm.* 1-3.
Semen globoſum, ſuboſseum.
(poſt *Caricem.*)

Flagellum. 1. S. culmo triquetro ſcandente folioſo ſcaberrimo, foliis trifariam retrorſum aculeatis, floribus paniculatis, rachi villoſa.
S. flagellum. *Berg. act. Holm.* 1765. *p.* 144. t. 4.
Carex lithoſperma. *S. V. XIII.*
Schœnus lithoſpermus. *Spec. pl.* 2. *Sloan. h.* 1. 118. t. 77. *f.* 1.
India occidentalis.

mitis. 2. S. culmo triquetro ſcandente foliisque lævibus, floribus paniculatis, rachi glabra. — *Berg. act. Holm.* 1765. *p.* 145. t. 5.
India occidentalis.

lithosperma. 3. S. culmo triquetro ſcabriuſculo erecto, foliis ſtrictis linearibus margine ſcabris, floribus paniculatis, rachis asperis.
Scirpus lithoſpermus *Sp. pl. I. p.* 51.
Cyperus. *Moriſon. l.* 3. *p.* 237. 1. 8. t. 11. *f.* 16.
India occidentalis.

latifolia. 4. S. culmo triquetro, folioſo erecto lævi; foliis lato-lanceolatis nervoſis, floribus paniculatis.
Jamaica.

fili-

filiformis. 5. S. culmo ſimplici filiformi lævi, foliis ſubulatis, ſpica ſimpliciuſcula, floſculis foliolo filiformi ſubjectis, glabris.
Hiſpaniola.

hirtella. 6. S. culmo ſimplici filiformi pubeſcenti, foliis linearibus, ſpica ſimplici, floſculis hirtis.
Jamaica.

SCHOENUS.

ſtellatus. 8=9. S. culmo ſub 3=quetro; ſpiculis conglomeratis involucro foliaceo, baſi colorato.
Sloan. h. 1. 9. 119. t. 78. *f.* 1. *Lamark.* *Encycl.* 1. 741. *Choin.* 11.
India Occidentalis.

Cladium. 12=13. S. culmo obtuſe triquetro folioſo lævi, foliis antrorſum aculeatis, paniculis diffuſis, ſpiculis unifloris ſeſſilibus diandris.
Cladium *Brown. jam.* 114.
Iamaica.

effuſus. 12=13. S. culmo folioſo, obtuſe 3=quetro lævi, foliis antrorſum aculeatis, paniculis erectioribus, ſpiculis 2=floris ſeſſi ibus diandris.*
Iamaica.

Reſtioides. 12=13. S. culmo inferne compreſſo-ancipitibus, glaberrimis; floribus paniculatis vaginis apice lanceolatis. *
India occidentalis.

Surinamenſis. 12=13. S. culmo folioſo triquetro, pedunculis corymboſis; inferioribus alternis diſtantibus, ſuperioribus confertis.
Schœnus ſurinamenſis. *Rottb. gram. n.* 89. t. 21. *f.* 1. *Pluk. amalth.* *p.* 112.
India occidentalis.

Cyperoides. 11=12. S. culmo triquetro folioſo, umbella terminali, ſpiculis glomeratis.
Iamaica.

gracilis. 13= S. culmo triquetro folioſo longiſſimo filiformi, ſpicis lateralibus pedunculatis.
Iamaica.

ſetaceus. 13-- S. culmo triquetro ſubnudo, foliis ſetaceis, ſpiculis aggregatis, floſculis diandris.
Jamaica.

puſillus. 13-- S. culmo triquetro nudo filiformi, ſpiculis terminalibus ſubfaſciculatis ſeſſilibus, foliolo ſubjecto, ſpicam æquante.
Jamaica.

capillaris. 13-- S. culmo triquetro nudo foliisque capillaribus, ſpiculis faſciculatis reflexis involucratis, involucello diphyllo.
Hiſpaniola.

CYPERUS.

viſcoſus. 18-19. C. culmo triquetro nudo, foliis convoluto-teretibus, umbella foliolo decompoſita ſpicis confertis, ſpiculis compreſſis ovatis patentibus. Cyperus 11. *Brown. jam.* 129.
Jamaica. ♃.

tenuis. 25-26. C. culmo triquetro nudo, umbella ſimplici, ſpiculis ſubulatis confertis, horizontali-reflexis, foliis involucri lineari-ſetaceis.
Jamaica.

filiformis. 25-26. C. culmo triquetro nudo filiformi, foliis ſetaceis, ſpicis terminalibus-ſeſſilibus confertis tereti-ſubulatis.
Jamaica.

confertus. 25-26. C. culmo triquetro nudo, umbella ſimplici folioſa, ſpiculis ovatis conglomeratis, glumis apice recurvis acuminatis.
Jamaica. ♃.

KYLLINGA.

filiformis. 3-4. K. umbella terminali ſimplici, ſpicis ſeſſilibus pedunculatisque ovatis, ſpiculis ovatis acutis, involucro triphyllo, partiali nullo.
Hiſpaniola, Jamaica.

pauci-

OLYRA.

pauciflora. 2. O. floribus axillaribus. Gramen floribus axillaribus, foliis ovatis. *Loefl. it. am.* 243. 100. *Jamaica.*

paniculata. 1. O. *panicula terminali, culmo ramoſo.* Olyra latifolia. *Linn.*

DIGYNIA.

SACHARUM.

polyſtachyon. 2–3. L. floribus paniculatis, ſpicis filiformibus longisſimis faſtigiatis, floſculis remotiusculis. * *St. Chriſtopher.*

LEERSIA.

Calyx nullus. *Cor. Gluma* bivalvis, clauſa.

(pone *Sacharum*)

monandra. 2. L. panicula effuſa, ſpicis remotis laxis, ſpiculis ſecundis ſubrotundis monandris, glumis lævibus. *Jamaica.*

hexandra. 3. L. panicula effuſa, ſpiculis alternis hexandris, glumis ſublævibus. *Jamaica.*

oryzoides. 1. L. *panicula effuſa, ſpiculis triandris, glumarum carinis ciliatis.* Phalaris oryzoides. *Linn.*

PASPATUM.

conjugatum. 7. P. ſpicis duabus horizontalibus conjugatis, ſpiculis ovatis, culmo erecto, foliis involutis. P. conjugatum. *Berg. act. Helv.* 7. 129. t. VIII. *India occidentalis.*

vaginatum. 8. P. ſpicis duabus, ſpiculis bifariis acuminatis, culmo ramoſo geniculato, geniculis vaginatis. *Jamaica.*

filiforme. 6. P. ſpica ſubſolitaris lineari-ſecunda, ſpiculis alternis ovatis compreſſis, culmo foliisque filiformibus.
Jamaica.

decumbens. 10. P. ſpica unica ſecunda, pedunculis longiſſimis, ſpiculis alternis, orbiculato-acuminatis glabris, culmo procumbente.
Jamaica.

PANICUM.

ſetoſum. 6–7. P. ſpica compoſita, ſpiculis paniculato-faſciculatis, ſetis floſculis immixtis longiſſimis, pedunculis ſubglabris.
Jamaica.

piloſum. 11–12. P. ſpicis paniculatis alternis ſecundis, ſpiculis geminis, altero minore, acuminatis lævibus; rachi compreſſo piloſo, culmo divaricato geniculato.
Milium jamaicenſe polystachion latifolium, ſemine duplicato. *Sloan. h.* 1. *p.* 114.
Jamaica.

molle. 11–12. P. ſpicis paniculatis alternis ſecundis patentibus, ſpiculis approximatis pedicellatis ſecundis muticis.
Panicum 2. *Brown. jam.* 133.
India occidentalis.

faſciculatum. 11–12. P. ſpicis paniculatis alternis erectis, ſubfaſtigiatis, ſpiculis ſecundis ſubrotundis.
Jamaica.

Chartaginenſe. 11–12. P. ſpicis paniculatis, foliis brevioribus, ſpiculis ſecundis ovatis acutis, culmo proſtrato geniculato ramoſiſſimo, vaginis pubeſcentibus.
America meridionalis, Chartagena. ♃.

nemoroſum. 26–27. P. panicula ſimplici, ramis diſtantibus erectis, floſculis remotis ſparſis ovatis acuminatis; culmo decumbente geniculato-vaginis colloque piloſis.
Jamaica, Domingo.

acumi-

acuminatum. 26–27. P. paniculis ſimplicibus foliis brevioribus, ramis capillaribus diffuſis, ſpiculis remotis obovatis, culmo decumbente geniculato ramoſo, foliis lanceolato-ſubulatis erectis, vaginisque villoſis.
Jamaica.

rigens. 26–27. P. panicula ſimplici rigida patente, culmo ramoſo decumbente, foliis horizontalibus ſcabris.
Jamaica.

fuſcum. 26–27. P. panicula ſimplici, ramis erectis, floſculis ſecundis geminis, altero brevius pedicellato, culmo erecto ſubdiviſo; foliis lato-lanceolatis.
Jamaica.

laxum. 26–27. P. panicula ſimplici nutante, ramis capillaribus, ſpiculis approximatis alternis adpreſſis, culmo ſimplici filiformi flaccido, foliis lineari-lanceolatis.
Milium. *Sloan. Hiſt.* 1. 114.
Jamaica.

flaveſcens. 27–28. P. panicula ſimplici erecta ſtricta, ramis ſubfaſtigiatis, infimis oppoſitis, ſpiculis approximatis ſecundis, pedicellis bifloris.
Jamaica.

diffuſum. 27–28. P. panicula ſimpliciuſcula capillari patenti, ſpiculis diſtantibus, culmo decumbente ſimplici, foliis linearibus, collo piloſis. Milium jam. anguſtifolium, panicula ſparſa. *Sloan. hiſt.* 1. 114.
Jamaica, Hiſpaniola.

oryzoides. 27–28. P. panicula ſubſimplici, ramis erectis, floſculis remotiuſculis ovatis acutis, culmo erecto indiviſo, foliis lato-lanceolatis baſi rotundatis, vaginis lævibus. Milium jamaicenſe arundinis folio. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 104.
Jamaica.

pallens. 32–33. P. panicula compoſita ovata, ramis confertis erectis, ſpiculis ovatis ſubulatis, culmo ſubdiviſo geniculato, foliis ovato-lanceolatis, vaginis collo margineque ciliatis.
Apluda Zeugitis. *Aubl. gvian.*
Jamaica.

lanatum. 32–33. P. panicula compoſita erecta glabra, ſpiculis ovatis, culmo ramoſo, foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, vaginis lanugi-noſo-hirſutis.
Jamaica.

Arundinaceum. 32–32. P. panicula compoſita patente, ramis ramuliſque ſtrictis capillaribus, ſpiculis ſubrotundis, culmo ſubdiviſo geniculato, foliis lato-lanceolatis acuminatis rigidis.
Jamaica.

polygamum. 32–33. P. panicula compoſita capillari patente, floſculis polygamis, culmo articulis hirſutis. Holcus. 2. *Brown. jam.* 366.
India occidentalis. ♃.

glutinoſum. 32–33. P. panicula compoſita patente, ramis flexuoſis, ſpiculis pedicellatis diſtantibus glutinoſis, culmo erecto ſimplici, foliis latioribus. *Sloan.* h. 1. 114. t. 71. *f.* 3.
Jamaica.

trichoides. 33–34. P. panicula ramoſiſſima patente, ramis ramuliſque ſubdiviſis capillaribus, culmo declinato geniculato, foliis ovato-lanceolatis glaberrimis. *Sloan.* h. 1. 86. 115. t. 72. f. 3.
Jamaica, Hiſpaniola.

MILIUM.

compreſſum. 4–5. M. ſpicis ſubternis, floſculis alternis muticis rachi adpreſſis, culmo medio articulato-compreſſo, pedunculis longiſſimis.
Jamaica, India occidentalis. ♃.

paniceum. 4–6. M. ſpicis ſubdigitatis alternis approximatis filiformibus; floſculis ſecundis muticis adpreſſis trigonis.
Jamaica.

digitatum. 4–5. M. ſpicis digitatis ſub4-ternis ſubſeſſilibus, floſculis muticis adpreſſis ſecundis, foliis margine cartilagineo-ſerratis.
Jamaica.

villoſum. 9. M. panicula laxa, floſculis muticis, calycibus lanatis. Andropogon inſulare *Linn.*
India occidentalis. ☉.

AGRO-

AGROSTIS.

purpuraſcens. 24–25. A. panicula contracta elongata, ramis adpreſſis erectis, floſculis inæqualibus acuminatis. Gramen pratenſe panicula & foliis anguſtisſimis — *Sloan.* h. 1. 115.
Jamaica.

MANISURIS.

granularis. 2. M. ſpicis lateralibus, valvulis exterioribus orbiculatis punctato-callofis, vaginis piloſis; culmo erecto.
Cenchrus granularis. *Linn.*
Gramen Cyperoides — *Sloan. j.* 36. h. 1. *p.* 128. t. 80. a LINNÆO pro Panico clandeſtino citatum.
Jamaica.

myurus. 1. M. *ſpicis lateralibus, valvulis exterioribus planis ovatis, apice lateribusque emarginatis, culmo adſcendente.* Maniſuris myurus. *Linn.*

CHLORIS.

POLYGAM. CAL. *Gluma communis* 2-valvis 2-flora, floſculo hermaphrodito ſeſſili.
☿ *Cal.* O. *Cor. Gluma* 2-valvis, ariſta terminali.
♂ *Cal.* O. *Cor. Gluma.* 1-valvis ariſtata.

cruciata. 1. C. ſpicis ſubquaternis cruciatis, floſculis acuminatis. Agroſtis cruciata *Linn.*
Jamaica.

ciliata. 2. C. ſpicis digitatis ſubqvinis; glumis corollinis margine ciliatis.
Jamaica.

petræa. 3. C. ſpicis quaternis ſtrictis erectiuſculis, ſpiculis confertis glabris muticis, culmo compreſſo.
Jamaica.

polydactyla. 4. C. ſpicis plurimis faſciculatis laxis, glumis corollinis margine ciliato-villoſis.
Andropogon polydactylon. *Linn.*
Jamaica.

radiata. 5. C. ſpicis (ſubſenis) plurimis faſciculatis erectiuſculis, floſculis ſubulatis ariſtatis glabris.
Agroſtis radiata *Linn.*
Andropogon faſciculatum *Linn.*
India occidentalis.

ANDROPOGON.

ſacharoides. 5-6. A. paniculæ ramis ſimplicibus, floſculis geminis, hermaphrodito ariſtato ſeſſili, altero mutico pedicellato tabeſcente, pedicellis rachisque lanatis.
Jamaica.

faſtigiatum. 12-13. A. paniculæ ſpicis ſolitariis, pedunculis elongatis, ſubfaſtigiatis, rachi lanata, floſculis ariſtatis, maſculo fertili.
Jamaica.

breviſolium. 23.- A. ſpicis lateralibus ſolitariis, floſculis alternis remotis ariſtatis, culmo geniculato compreſſo.
Jamaica.

CENCHRUS.

ſetoſus. 4-5. C. ſpica lineari-oblonga, involucris ſetoſis, ſetis inermibus, interioribus baſi villoſis, villis ciliatis, glumis lævibus.
India occidentalis.

POA.

glutinoſa. 8-9. P. panicula patente ſtricta, ſpiculis ſubnovemfloris hirſutiuſculis glutinoſis, culmo ſimplici, foliis ſubpiloſis. *Sloan.* h. 114. t. 71. *f.* 2.
Jamaica.

poli-

prolifera. 8–9. P. panicula patente ſtricta, ſpiculis multifloris, (18—20) culmo ramoſisſimo nodoſo, ad nodos prolifero. *. *Inſulæ caribææ.*

PICRAMNIA.

DIOIC. ♂. *Calyx* tripartitus.
Cor. tripetala
♀. *Cal. Cor.* maris.
Bacca bilocularis.
(poſt *Oſyridem*).

Antideſma. 1. PICRAMNIA.
Antideſma. *Brown. jam.* 123. Berberis fruticoſa, racemoſa, fraxini-folio alato, fructu nigro dipyreno. *Sloan.* h. 2. 101. t. 209. *f.* 2. *Jamaica, Domingo.* ♄.

TRIGYNIA.

HOLOSTEUM.

diandrum. 1–2. H. caulibus procumbentibus rigidioribus, foliis ſubrotundis, floribus diandris. *Jamaica.* ☉.

PHYLLANTHUS.

nutans. 1–2. P. fruticoſa, foliis alternis ovalibus ſubtus glaucis; racemis terminalibus folioſis nutantibus. Tilia forte arbor racemoſa, folio longiore ſubtus albicante. *Sloan.* h. 2. 19. t. 158. *f.* 3. *Jamaica.* ♄.

mimoſoides. 1–2. P. caule fruticoſo, ramis virgatis, foliis pinnatis floriferis. * *Antigua.* ♄.

Conami

Conami. 1-2. P. caule fruticoſo ramoſisſimo, ramis diffuſis, foliis petiolatis ſubrotundis, apice attenuatis obtuſiuſculis, pedunculis faſciculatis axillaribus.
Conami braſilienſis. *Aubl. gvian.* 926. t. 354.
India occidentalis. ♄.

XYLOPHYLLA.

arbuſcula. 2. X. foliis pinnatis lanceolatis acuminatis ſubcrenatis coriaceis, floribus pedunculatis triandris monoicis.
Jamaica. ♄.

falcata. 3. X. foliis ſparſis lineari-lanceolatis ſubfalcatis crenatis, floribus ſubſesſilibus triandris monoicis. * *Pluk. ph.* t. 247. 4.
Synon. et. figur. Commelin. Catesb. Sebæ.
Bahama. ♄.

anguſtifolia. 4. X. foliis pinnatis lineari-lanceolatis lineatis crenatis, floribus pedunculatis hermaphroditis. Phyllanthus 2. *Brown. jam.* 188.
Jamaica. ♄.

linearis. b. foliis linearibus lineatis, floribus albis.

montana. 5. X. foliis diſtichis lato-lanceolatis inciſo crenatis; ramis apice ancipitibus, floribus ſesſilibus.
Jamaica. ♄.

latifolia. 1. X. *foliis pinnatis lato-lanceolatis crenatis; floribus pedunculatis hermaphroditis hexandris, femineiſque mixtis.* X. latifolia. *Linn.*

CLAS-

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

ERNODEA. (XLVII. æ.)

Cor. 1 petala, hypocrateriformis.
Cal. 4-partitus.
Bacca 2-locularis. *Sem.* ſolitaria.
(pone *Pauettam.*)

littoralis. 1. ERNODEA. Knoxia 1. *Brown. jam.* 140. Thymelæa — *Sloan.* j. 168. h. 2. p. 93. l. 189. f. 1. 2.
Jamaica ♄.

HEDYOTIS.

rupeſtris. 7. H. foliis 4-fariis ſubulatis canaliculatis, floribus ſeſſilibus axillaribus, corollis villoſis tubo curvo. Hedyotis americana. *Jacq. am.* p. 20.
Thymelæa &c. *Sloan.* h. 2. *p.* 94. *l.* 202. *f.* 1.
India occidentalis. ♄.

SPERMACOCE.

villoſa. 3–4. S. villoſa, ſimplex, foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, ſummis qvaternis, floribus verticillatis, ſtaminibus incluſis.
Pulegium &c. *Sloan.* cat. 64.
Jamaica. ☉.

DIODIA.

ſimplex. 2. D. caule herbaceo ſimplici erectiuſculo lævi, foliis ovato-lanceolatis.
Jamaica.

pro-

proſtrata. 3 D. caule ſuffruticoſo ſubdiviſo, ramis proſtratis filiformibus, foliis linearibus hirſutiuſculis revolutis. Diodioides *Loefl. it.* 201.
Jamaica.

ſcandens. 4. D. caule ſcandenti ſuffruticoſo, foliis ovato-lanceolatis rigidis ſcabris.
Hiſpaniola. ♄.

ſarmentoſa. 5. D. caule flaccido fruticoſo, ramis oppoſitis patentibus, foliis oblongis acutis ſcabriuſculis.
Jamaica. ♄.

CATESBAEA.

parviflora. 2. C. corollis tubo tetragono abbreviato, baccis ſubrotundis.
Jamaica. ♄.

longiflora. 1. C. *corollis tubo longiſſimo, baccis ovalibus.* C. ſpinoſa *Linn.*

IXORA.

faſciculata. 3. I. foliis ovato-ellipticis, ramulorum ſubfaſciculatis pedunculis filiformibus ſub 3-floris.*
Jamaica. ♄.

multiflora. 4. I. ? foliis lanceolato-ovatis faſciculatis, pedunculis aggregatis unifloris breviſſimis, baccis monoſpermis. ♄.
Jamaica.

HOFFMANNIA.

Calyx. 4-dentatus
Corolla hypocraterif. 4-partita.
Filamenta nulla.
Bacca bilocularis, polyſperma.
(poſt *Peteſiam*).

pedunculata. 1. HOFFMANNIA.
Jamaica.

COC-

COCCOSIPSILUM. (Browne)

Calyx quadripartitus, ſuperus.
Corolla infundibuliformis.
Bacca inflata, 2-locularis, polyſperma.
(inter *Mitchellam* et *Callicarpam*.)

repens. 1. COCCOSIPSILUM. *Brown. jam.* 144.
Jamaica.

WALLENIA.

Calyx quadrifidus, inferus.
Corolla tubuloſa, 4-fida.
Bacca 1-ſperma.
(ante *Callicarpam*).

laurifolia. 1. WALLENIA.
Peteſioides laurifolium. *Jacq. am.* 17.
Bryonia nigra fruticoſa, foliis laurinis. *Sloan.* h. 2. 234. *t.* 145. *f.* 5.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

CALLICARPA.

ferruginea. 1-2. C. foliis lato-lanceolatis ſerratis ſubtus ſcabriuſculis, cymis terminalibus axillaribusque.
Jamaica. ♄.

reticulata 1-2. C. foliis elliptico-lanceolatis ſubſerratis rugoſis, ſubtus tomentoſo incanis. *
Jamaica. ♄.

AEEGIPHILA.

elata. 2. Æ. foliis ellipticis acuminatis membranaceis, paniculis terminalibus, calycibus pubeſcentibus.
Knoxia 2. *Brown. jam.* 140.
India occidentalis. ♄

foetida

foetida. 3. Æ. foliis ouato-lanceolatis, ſubtus petiolisque hirſutis, pedunculis axillaribus, ſolitariis. *Jamaica.* ♄.

trifida. 4. Æ. foliis ovato-lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus trifidis confertis. *Jamaica.* ♄.

SAMARA.

coriacea. 2. S. floribus ſeſſilibus conglomeratis, foliis lanceolato-ovatis acutis ſubcoriaceis. *Jamaica.* ♄.

LABATIA.

Calyx 4-phyllus, inferus.
Corolla ſubcampanulata, 4-fida.
Laciniæ 2 minutæ in diviſuris corollæ.
Capſula 4-locularis.
Sem. ſolitaria.
(inter *Blæriam* & *Budlæam.*)

ſeſſiliflora. 1. LABATIA. *Hiſpaniola.* ♄.

VISCUM.

flavens. 6–7. V. foliis ouatis venoſis, racemis axillaribus utrinque ternis, 4-ternisque. Viſcum aliud racemoſum, foliis latisſimis. *Plum. ic.* 256. t. 258. f. 4. Viſcum racemoſum. *Aubl. gvian.* 895. 4. *India occidentalis.* ♄.

POTHOS.

violacea. 3–4. P. foliis ovato-lanceolatis integris nervoſis punctatis. Arum 13. *Brown. jam.* 333. Dracontium ſcandens. *Aubl. gvian.* 836. 3. *Jamaica, India occidentalis.* ♃.

marcro-

macrophylla. 5–6. P. foliis cordatis, ſpadice longisſima, radice nodoſa.
Dracontium amplis foliis cordatis, radice nodoſa rubra. *Plum. fil.* t. 63.
Dracontium cordatum. *Aubl. gvian.* 836. 3.
India occidentalis. ♃.

AMMANNIA.

ſangvinolenta. 3–4. A. foliis ſemiamplexicaulibus, baſi cordatis, floribus ſubpedunculatis, octandris petaligeris.
Jamaica, Domingo.

FAGARA.

trifoliata. 1–2. F. foliis ternatis foliolis obovatis ſubemarginatis integris nitidis ſubtus punctatis. *
Dominica. ♄.

emarginata. 5. F. foliis pinnatis, foliolis ovatis emarginatis venoſis, racemis terminalibus compoſitis, floribus triandris.
Lauro affinis therebinthi folio alato ligno odorato candido. *Sloan.* h. 2. 24. t. 168. f. 4.
Jamaica. ♄

ſpinoſa. 5. F. foliis pinnatis ſesſilibus ovatis acuminatis ſubtus ramisque ſpinoſis, floribus 3–andris.
Jamaica. ♄.

acuminata. 5. F. foliis pinnatis, foliolis integris ellipticis acuminatis nitidis coriaceis, floribus cymoſis 3–andris. *.
Jamaica. ♄.

LUDWIGIA.

repens. 2–3. L. foliis oppoſitis ovatis, pedunculis ſolitariis axillaribus, caule repente.
Jamaica. ⊙.

DORSTENIA.

cordifolia. 1–2. D. ſcapis radicatis, foliis cordatis ovatis denticulatis, receptaculis orbiculatis.
D. cordifolia *Lamark Encycl.* 2. p. 317. 2.
Jamaica, domingo. ♃.

BOEHMERIA.' Jacq. (LIII.)

MONOIC. ♂. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* O.
♀. *Calyx* nullus, ſed ſquamæ confertæ, inter quas ſingulas:
Germen obovatum.
Stylus unicus.
Semen unicum, compreſsum.
(ante *Urticam*).

caudata. 1. B. foliis oppoſitis ovatis acutis ſerratis, racemis longiſſimis pendulis, floribus dioicis, caule ſuffruticoſo.
Urtica. 11. *Brown. jam.* 337.
Jamaica. ♄.

littoralis. 2. B. foliis oppoſitis ovato-lanceolatis ſerratis, floribus conglomeratis axillaribus monoicis mixtis, caule herbaceo tetragono.
Hiſpaniola.

cylindrica. 3. B. foliis oppoſitis ovatis acuminatis ſerratis, racemis ſpicatis axillaribus erectis ſimplicibus. Urtica cylindrica *Linn.*

ramiflora. 4. B. foliis alternis lato-lanceolatis acuminatis ſerratis rugoſis, floribus aggregatis axillaribus lateralibusque monoicis diſtinctis, maſculis triandris.
B. ramiflora. *Jacq. am.* 246. t. 137.
Caturus ramiflorus. *Linn.* Urtica 10. *Brown. jam.* 337.
India occidentalis ♃.

hirta. 5. B. foliis alternis ovatis acutis ſerratis hirſutis, floribus monoicis congeſtis axillaribus mixtis.
Jamaica.

URTI-

URTICA.

* *Foliis oppoſitis.*

reticulata. 5–6. U. foliis oppoſitis oblongis acutis ſubtus reticulatis, ſtipulis ovatis integris, racemis paniculatis, foliis brevioribus.
Act. Holm. Tom. VI. 1. 30.—VIII. 1. 70.
Jamaica.

laxa. 6–7. U. foliis oppoſ. ovatis acuminatis ſerratis; floribus dioicis, maſculis pedunculatis confertis, femineis racemoſis, caule laxo.
Act. Holm. t. VIII. 1. 58.
Hiſpaniola.

Betulæfolia. 6–7. U. foliis oppos. cordato-ſubrotundis ſerratis, ſtipulis integris, floribus racemoſis, caule proſtrato adſcendente.
Act. Holm. t. VIII. 1. 59.
Hiſpaniola.

diffuſa. 6–7. U. foliis oppoſ. ovatis acute ſerratis hispidis, ſtipulis revolutis, racemis paniculatis folio longioribus; caulibus procumbentibus.
Act. Holm. t. VI. 1. 30.
Jamaica.

rufa. 6–7. U. hirſuta tota; foliis oppoſ. oblongis ſerratis, ſtipulis ſubrotundis perſiſtentibus; racemis terminalibus, caule ſuffruteſcente ramoſo. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 59.
Jamaica.

rugoſa. 7–8. U. fol. oppoſ. oblongis ſerratis nervoſis rugoſis, racemulis terminalibus dioicis; caule ſimplici erecto. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 60.
Hiſpaniola.

repens. 7–8. U. foliis oppoſ. ovalibus monoicis, caule ſimplici repente. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 61.
Hiſpaniola.

nudicaulis. 9–10. U. foliis ſubterminalibus oppoſitis oblongis acuminatis integris trinerviis; caule anguloſo, inferne nudo racemifero, floribus dioicis.
Act. Holm. t. VI. 1. 36. VIII. 1. 71.
Jamaica.

ſtolonifera. 9-10. U. ſubcauleſcens, foliis oppoſitis oblongis ſubſerratis, floribus dioicis, ſtolonibus radicalibus. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 62.
Hiſpaniola.

ciliata. 11-12. U. foliis oppoſ. ovatis ciliatis ſerratis, floribus terminalibus aggregatis ſubpedunculatis monoicis; caule divaricato. *Act. Holm.* t. VI. 1. 32.
Jamaica.

radicans. 11-12. U. foliis oppoſ. cuneato-ovatis crenatis nitidis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, caule ramisque radicantibus. *Act. Holm.* t. VI. 1. 29. t. VIII. 1. 71.
Jamaica.

nummularifolia. 12-13. U. foliis oppoſ. orbiculatis crenatis hirſutis, floribus terminalibus confertis monoicis; caule filiformi ſimplici repente. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 63. tab. 1. f. 2.
Nummularia ſaxatilis minima repens, floribus albis, fol. crenatis villoſis. *Sloan. H.* 1. 206. t. 131. f. 4.
Jamaica.

depreſſa. 12-13. U. foliis oppoſ. ſubrotundis crenatis glabris; floribus terminalibus confertis, caule repente ſubdiviſo. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 64.
Jamaica.

herniarioides. 12-13. U. foliis oppoſ. ſubrotundis integris terminalibus qvaternis, floribus monoicis diſtinctis; caule filiformi diffuſo. *Act. Holm.* t. VIII. 1. 64. tab. 2. f. 1.
Hiſpaniola. ⊙.

ſerrulata. 12-13. U. foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus foliis brevioribus, floribus capitellatis monoicis; caule fruteſcente tetragono. *Act. Holm.* h. VIII. 1. 65.
Jamaica. ♄.

lucida. 12-13. U. foliis oppoſ. ſemipinnatis nitidis, pedunculis axillaribus folio longioribus, floribus capitellatis; caule fruteſcente angulato. *Act. Holm.* t. VI. 1. 31. VIII. 1. 70.
Jamaica. ♄.

micro-

micro-phylla. 12-13. U. foliis ovatis acutis integerrimis, minoribus ovatis oppoſitis et intermixtis, floribus dioicis; caulibus ſimpliciuſculis adſcendentibus. Parietaria microphylla *Linn. Act. Holm.* VIII. 1. 60.

trianthe-moides. 12-13. U. foliis oppos. oblongis integerrimis, alternis majoribus, floribus monoicis, caule erecto ramoſo. *Act. Holm.* VIII. 1. 68. *Hispaniola.*

cuneifolia. 12-13. U. foliis oppoſ. cuneatis obovatis apice dentatis, alternis majoribus; racemulis pedunculatis, floribus monoicis.
U. crenulata. *Act. Holm.* VI. 1. 35. VIII. 1. 70.
Jamaica.

* * *Foliis alternis.*

lappulacea. 12-13. U. foliis alternis ovatis ſcabriuſculis, floribus terminalibus ſubſeſſilibus monoicis, femineis trigonis; caule diffuſo.
U. humilis. *Act. Holm.* VI. 1. 34. VIII. 1. 69. tab. 2. f. 2.
Jamaica, Domingo.

ſeſſiliflora. 13-14. U. foliis alternis lanceolato-ovatis crenatis, racemis brevisſimis axillaribus, floribus monoicis diſtinctis; caule erecto. l. c. VI. 1. 33.
Jamaica.

elata. 15-16. U. foliis alternis ovatis acutis ſerratis, caule arboreo, ramis nudiuſculis racemiferis, floribus dioicis.
Jamaica.

MANETTIA.

Lygiſtum. 2. M. foliis ovatis acutis venoſis, caule volubili ſuffruteſcente. Peteſia Lygiſtum. *Linn.* Lygiſtum. *Brown. jam.* 142. t. 3. f. 2.
Jamaica.

reclinata. 1. M. *foliis ovatis acutis pubeſcentibus, caule reclinato herbaceo.* M. reclinata. *Linn.*

ALCHEMILLA.

monandria. 1-2. A. foliis tripartito-trifidis hirſutis; floribus monandris confertis axillaribus.

DIGYNIA.

SCHÆFFERIA. Jacq.

DIOIC. ♂. *Calyx* 4-5-phyllus.
Cor. 4-petala aut nulla.
♀. *Calyx* 4-5-partitus.
Cor. 4-petala aut nulla.
Bacca 2-locularis.
Sem. ſolitaria.

completa. 1. S. floribus 4-petalis axillaribus. Schæfferia fruteſcens. *Jacq. am.* 259.
Buxi folio majore acuminato, arbor baccifera, fructu minore croceo dipyreno. *Sloan.* h. 102. t. 209. f. 1.
India occidentalis. ♄.

lateriflora. 2. L. floribus lateralibus apetalis.
Hiſpaniola. ♄.

TRIGYNIA.

CRANTZIA. (XLIV.)

MONOIC. ♂. *Calyx* 4-phyllus.
Cor. O. *Filamenta* ovata.
♀. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* O.
Styli conici.
Capſula 3-cornis, 3-locularis.
Sem. bina.
(inter *Littorellam et Ciccam.*)

lævigata. 1. CRANTZIA.
Jamaica. ♄.

ARGY-

ARGYTHAMNIA. (XXXVIII.)

MONOIC. ♂. *Calyx* 4-phyllus.
Corolla 4-petala.
♀. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* O.
Styli dichotomi.
Capſula 3-cocca. *Sem.* ſolitaria.
(poſt *Ciccam.*)

candicans. 1. ARGYTHAMNIA. *Brown. jam.* 338. Ricino affinis odorifera fruticola minor &c. *Sloan.* h. 2. 132. t. 86. 3. *Jamaica.* ♄.

TETRAGYNIA.

MYGINDA.

Rhacoma. 2. M. foliis lanceolato-ovatis obtuſis crenatis, floribus monogynis, ſtylo 4-fido. Rhacoma croſſopetalum *Linn.*

latifolia. 3. M. foliis ellipticis crenulatis coriaceis, floribus ſtigmatibus 2 4 ſeſſilibus. * *India occidentalis.* ♄.

uragoga. 1. M. *foliis ſubcordatis acuminatis ſubſerratis pubeſcentibus.* M. uragoga *Linn. Jacq.*

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

HELIOTROPIUM.

inundatum. 3–4. H. foliis oblongis obtuſis hirſutis, ſpicis quaternis erectis; caule fruteſcente.
Inſulæ caribææ. *

ANAGALLIS.

pumila. 1–2. A. caule erecto, foliis ſubrotundis acutis ſeſſilibus.
Jamaica. ⊙.

TOURNEFORTIA.

bicolor. 4–6. T. foliis ovatis acuminatis glabris, ſuperne rugoſiuſculis; ſpicis cymoſis erectis recurvis.
Jamaica. ♄.

LISIANTHUS.

exſertus. 5. L. foliis ovato-lanceolatis, pedunculis trichotomis, genitalibus longiſſimis.
Jamaica. ♄.

latifolius. 6. L. foliis lanceolato-ellipticis acuminatis, pedunculis trichotomis, laciniis corollæ erectis, genitalibus incluſis.
Jamaica. ♄.

umbellatus. 7. L. foliis elongatis obovatis, floribus terminalibus pedunculatis umbellatis, laciniis corollæ breviſſimis obtuſis erectis.
Jamaica. ♄.

frigidus. 8. L. foliis ovatis acuminatis coriaceis, panicula terminali trichotoma, corollis ventricoſis, laciniis ſubrotundis. *
Guadeloupe montes. ♄.

RON-

RONDELETIA.

* *Sem. plura.*

piloſa. 3-4. R. foliis petiolatis ouatis utrinque piloſis, pedunculis axillaribus foliis brevioribus 3-fidis, floribus tetrandris. *
Jamaica. ♄.

virgata. 3-4. R. foliis petiolatis cordatis ſubrotundis, ramis lateralibus filiformibus patentibus floriferis apice trifidis, floribus confertis tetrandris.
Hiſpaniola. ♄.

** *Sem. ſubſolitaria.*

thyrſoidea. 3-4. R. foliis oblongis membranaceis, ſubtus pubeſcentibus, thyrſis lateralibus.
Jamaica. ♄.

tomentoſa. 3-4. R. foliis ovatis acuminatis tomentoſis, pedunculis tripartitis axillaribus brevibus. Peteſia 3. *Brown. jam.* 144.
Jamaica. ♄.

umbellulata. 3-4. R. foliis lanceolato-ovatis, ſub-hirſutis, pedunculis axillaribus ſolitariis, apice trichotomis, floribus confertis.
Jamaica. ♄.

incana. 3-4. R. foliis ovato-lanceolatis, ſubtus incanis ſcabris; pedunculis axillaribus ſimplicibus trifloris.
Jamaica. ♄.

hirſuta. 3-4. R. foliis ovatis acutis hirſutis, pedunculis axillaribus trichotomis laxis, floribus hirſutis.
Jamaica. ♄.

hirta. 3-4. R. foliis ellipticis acuminatis hirtis nervoſis, ſubtus piloſis rigidis, pedunculis axillaribus 3-partitis erectis. *
Jamaica. ♄.

CINCHONA.

floribunda. 4. C. floribus paniculatis glabris, capſulis turbinatis lævibus, foliis ellipticis acuminatis glabris. *Kinkina Piton.* Gall. *Act. Nat. curioſor.* 1787.
St. Lucia, Martinica, Hiſpaniola. ♄.

brachycarpa. 5. C. floribus paniculatis glabris, capſulis ovatis coſtatis; foliis ellipticis obtuſis glabris. *
Jamaica. ♄.

anguſtifolia. 6. C. floribus paniculatis glabris, capſulis oblongis pentagonis, foliis lineari-lanceolatis pubeſcentibus. *Act. Stockh.* 1787. VIII. 2. 117. *tab.* III.
Hiſpaniola. ♄.

BELLONIA.

ſpinoſa. 2. B. ſpinoſa, foliis ovatis angulatis, dentato-ſerratis, pedunculis axillaribus unifloris.
Hiſpaniola. ♄.

aſpera. 1. B. *foliis ovatis ſerratis, floribus corymboſis terminalibus. Plum. Linn.*

PORTLANDIA.

coccinea. 1–2. P. floribus pentandris, foliis ellipticis coriaceis.
Jamaica. ♄.

SOLANDRA. (XL.)

Cor. infundibuliformis, maxima.
Cal. rumpens.
Stam. inclinata.
Bacca ſupera 4-locularis polyſperma.
(pone *Portlandiam.*)

grandiflora. 1. SOLANDRA.
Act. Stockh. VIII. 4. 300. tab. XI.
Stramonium ſcandens flore luteo. *Plum. fig.*
Jamaica. ♄.

PSYCHOTRIA.

hirſuta. P. ſtipulis lanceolatis integris deciduis, foliis ovato-lanceolatis hirſutis, caule hirſutiſſimo, panicula patente.
Jamaica. ♄.

glabra.

glabrata. P. ſtipulis indiviſis deciduis, foliis ovatis glaberrimis nitidis, floribus paniculatis erectis.
Jamaica. ♄.

Laurifolia. P. ſtipulis ovatis acuminatis deciduis, foliis ovato-lanceolatis craſſiuſculis glabris, paniculis erectis, baccis ſubrotundis.
Hiſpaniola. ♄.

Citrifolia. P. ſtipulis ovatis perſiſtentibus, foliis ellipticis acuminatis glaberrimis ſubcoriaceis; panicula foliis breviore, baccis oblongis coſtatis.*
India occidentalis. ♄.

tenuifolia. P. ſtipulis ovatis apice 2-fidis deciduis, foliis oblongis acutis tenuioribus glabris; paniculis erectis.
Hiſpaniola. ♄.

nervoſa. P. ſtipulis ovatis emarginatis deciduis, foliis ovatis acuminatis nervoſis ſubundulatis, paniculis erectis.
P. chartaginenſis? *Jacqu. am.* 65. t. 174. f. 22.
Jamaica. ♄.

foetens. P. ſtipulis acuminatis integris deciduis, foliis lanceolato ovatis glabris, panicula patentiſſima, pedunculis reflexis filiformibus.
Jamaica. ♄.

marginata. P. ſtipulis integris acuminatis, foliis lanceolato-ovatis, margine cartilagineo-ſetoſis; paniculis laxis.
Pſychothrophum 6. *Brown. jam.* 161.
Jamaica. ♄.

grandis. P. ſtipulis triangularibus revolutis, apicibus convolutis ſubulatis; foliis cuneiformibus obovatis, caule angulato ſuffruteſcente.
Jamaica, Domingo. ♄.

uliginoſa. P. ſtipulis connatis acutis convexis; foliis lanceolato ovatis, ſeminibus compreſſis criſtatis, caule ſubherbaceo erecto.
Pſychotrophum. 1. *Brown. jam.* 160.
Jamaica.

nutans. P. ſtipulis geminis ſubulatis, foliis lanceolatis acutis nervoſis, floribus cymoſis, baccis nutantibus.
Hiſpaniola. ♄.

horizon-

horizontalis. P. ſtipulis ovatis, foliis lanceolato-ovatis acutis, ramis foliiſque horizontalibus, floribus paniculatis.
Hiſpaniola. ♄.

paraſitica. P. ſtipulis amplexicaulibus integris, foliis ellipticis coriaceo-ſubſucculentis, cymis pedunculatis trichotomis, longitudine foliorum. * Viſcoides pendulum *Jacq. am.* 73. t. 51. f. 1.
India occidentalis, Montſerrat. &c. ♄.

myrſtiphyllum. P. exſtipulata, foliis lanceolato-ovatis integris nitidis rigidis, ramis ſecundis, floribus paniculatis. Myrstiphyllum *Brown. jam.* 152. *Sloan.* h. 2. 102. t. 209. f. 2.
Jamaica. ♄.

pubeſcens. P. ſtipulis geminis ſubulatis, foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, paniculis erectis, corollis cylindricis. Pſycotrophum 5. *Brown. jam.* 161.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

pedunculata. P. ſtipulis bidentatis, foliis ovato-lanceolatis rugoſis, floribus cymoſis, pedunculis elongatis. Pſycotrophum 4. *Brown. jam.* 160.
Jamaica. ♄.

crocea. P. ſtipulis geminis ſubulatis, foliis ovatis nervoſis, panicula erecta terminali crocea, pedunculis coloratis. Pſychotrophum 2. *Brown. jam.* 160. t. 13. f. 2, 1.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

alpina. P. ſtipulis truncatis bidentatis, foliis membranaceis multinerviis, panicula erecta, corollis cylindricis elongatis diaphanis. Chiococca paniculata *Linn. ſuppl.* ?
Jamaica. ♄.

corymboſa. P. ſtipulis geminis acutis, foliis ovato-lanceolatis conſiſtentibus nitidis; floribus erectis cylindraceis; baccis corymboſis, pedunculis coloratis.
Jamaica. ♄.

patens.

patens. P. ſtipulis geminis ſubulatis, foliis diſtichis ovato-lanceolatis membranaceis, ramis patentibus, panicula ſecunda. Nonatelia paniculata. *Aubl. gvian.* 184. tab. 70. f. 2.?
Jamaica. ♄.

brachiata. P. ſtipulis ovatis bifidis, racemis brachiatis, floribus terminalibus aggregatis ſeſſilibus.
Jamaica. ♄.

involucrata. P. ſtipulis utrinque bidentatis, foliis ovato-lanceolatis glaberrimis, pedunculis trifloris terminalibus, floribus involucratis, involucro 3-phyllo. * Nonatelia officinalis. *Aubl. gvian.* 182. t. 70. f. 1.
India occidentalis. ♄.

Pavetta. P. ſtipulis ſubulatis deciduis, ramis paniculæ brachiatis trichotomis, corollis tubo longiori, laciniis patentibus. Lonicera foliis lanceolato-ovatis. *Plum. ic.* t. 156. f. 1. Ceraſo affinis arbor baccifera, fructu cæruleo teſticulato. *Sloan.* h. 2. 96. t. 189. f. 4.
India occidentalis. ♄.

CEPHAELIS. (XLVIII. d.)

Flores capitati involucrati.
Corolla tubuloſa.
Stigma 2-partitum.
Bacca biſperma.
Receptaculum paleaceum.
(inter *Morindam* & *Conocarpum.*)

violacea. 1. C. capitulis globoſis terminalibus, involucro 5-phyllo, foliis nervoſis glabris.
Tapogomea violacea. *Aubl. gvian.* 157. t. 60.
India occidentalis. ♄.

elata. 2. C. capitulis globoſis terminalibus, pedunculis elongatis, involucro diphyllo, foliis glabris.
Jamaica. ♄.

axillaris. 3. C. capitulis axillaribus ſeſſilibus. *
St. *Chriſtopher.* ♄.

muſcoſa. 4. C. capitulis ſubrotundis ſubſeſſilibus terminalibus, paleis dentatis. Morinda muſcoſa *Jacq. amer.* 65. t. 45.
India occidentalis. ♄

HAMELLIA.

axillaris. 2. H. ſubherbacea, racemis axillaribus, floribus ſubſecundis ſeſſilibus, foliis ovato-lanceolatis.
Jamaica, Hiſpaniola.

Chryſantha. 3. H. racemis terminalibus, foliis oblongis cuneatis acuminatis glaberrimis, floribus pedicellatis. Campanula 2. *Brown. jam.* 166. t. 14. f. 1.
Lonicera. *Plum.* ic. 218. f. 1.
Jamaica. ♄.

ventricoſa. 4. H. racemis terminalibus axillaribusque, corollis campanulatis ventricoſis, foliis ternatis. Campanula 1. *Brown. jam.* 166.
Jamaica. ♄.

coccinea. 1. H. racemis terminalibus coloratis, foliis ternatis villoſo-pubeſcentibus.
H. patens. *Linn.*? *Jacq. am.* 72. t. 50.
Lonicera. *Plum. ic.* 218. f. 2.
Hiſpaniola. ♄.

SABICEA. Aublet (XLI. b.)

Involucrum 4- fidum.
Corolla infundibuliformis.
Stigma 5-partitum.
Bacca 5-locularis, polyſperma.
(poſt *Hamelliam.*)

hirta. 1. S. foliis ovato lanceolatis acuminatis hirſutis, floribus pedunculatis.
Jamaica. ♄.

cinerea. 2. S. foliis ellipticis acutis tomentoſis ſubtus incanis, floribus ſubſeſſilibus. *
Sabicea cinerea *Aubl. guian.* 192. tab. 75.
India occidentalis. ♄

SOLA.

SOLANUM.

ſubinerme. 9–10. S. caule ſubinermi fruticoſo, foliis elliptico-lanceolatis integris, ſupra glabris ſubtus incano-tomentoſis. *Jacq. am.* 50.
S. laurifolium *Mill. dict.*
India occidentalis. ♄.

torvum. 26–27. S. caule aculeato fruticoſo, aculeis curvis; foliis cordatis ovatis ſinuatis tomentoſis, rachibus aculeatis, calycibus inermibus.
Solanum Indicum. *Spec. pl.* 1.
India occidentalis. ♄.

ſcandens. 26–27. S. caule aculeato fruticoſo ſcandente, foliis angulatis, petiolis, rachibus calycibusque aculeatis, racemis laxis.
Hiſpaniola. ♄.

JAQUINIA.

venoſa. 1–2. I. foliis ovato-lanceolatis venoſis ſubmembranaceis. *
India occidentalis. ♄.

CORDIA.

micranthus. 5-6. C. foliis ellipticis lanceolatis integerrimis membranaceis venoſis, racemis compoſitis laxis.
India occidentalis., Jamaica. ♄.

elliptica. 5–6. C. foliis ellipticis acuminatis integris coriaceis, ramis compoſitis diffuſis; drupis acuminatis.
Jamaica. ♄.

EHRETIA.

virgàta. 3–4. E. foliis oblongis integris ſuperne ſcabris, ramis filiformibus, floribus terminalibus ſparſis, calycibus hirſutis.
Hiſpaniola. ♄.

VAR-

VARRONIA.

mirabilloides. 2-3. V. foliis ovatis rugoſis ſerratis, floribus racemoſis ſecundis, corollis hypocrateriformibus. V. Mirabilloides. *Jacq. am.* 41. t. 33. *Hiſpaniola.* ♄.

ARDISIA.

Calyx 5-phyllus.
Cor. reflexa. *Stigma* ſimplex.
Drupa monoſperma.
(inter *Varroniam & Laugueriam.*)

Tinifolia. 1. A. floribus paniculatis, foliis ellipticis integris nervoſis, caule arboreo. Jaſminum forte arboreum, foliis laurinis obtuſis. *Sloan.* h. 2. p. 98. t. 205.

coriacea. 2. A. floribus paniculatis, foliis oblongis integris aveniis coriaceis. *India occidentalis.* ♄.

ſerrulata. 3. A. floribus paniculatis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis rugoſis, caule fruticoſo pubeſcente. *Domingo.* ♄.

lateriflora. 4. A. racemis lateralibus axillaribusve compoſitis, floribus umbellatis, foliis oblongis acuminatis integerrimis, caule fruticoſo. * *India occidentalis.* ♄.

paraſitica. 5. A. racemis axillaribus ſimplicibus, foliis ſeſſilibus, lanceolato-ovatis lineatis, caule fruticoſo. * *Montſerrat.* ♄.

LAUGERIA.

lucida. 2. L. foliis oblongis obtuſis integris membranaceis nitidis, racemis dichotomis, drupis nucibus bilocularibus. *Loefl. it.* 270. n. 154. *India occidentalis, Jamaica.* ♄.

tomentoſa. 3. L. foliis ovatis acutis integris ſubtus tomentoſis, racemis dichotomis, drupis nuce biloculari. *Jamaica.* ♄.

odora-

odorata. 1. L. *foliis ſubovatis acutis glabris, caule ſubſpinoſo; racemis paniculatis, drupis nucibus 5-locularibus.* Linn. Jacqu.

CESTRUM.

hirtum. 5. C. floribus ſubſpicatis axillaribus; foliis ſubcordatis ovatis acutis, ſubtus ramuliſque hirtis.
India Occidentalis, Jamaica. ♄.

CHRYSOPHYLLUM.

monopyrenum. 1–2. C. foliis ellipticis acuminatis, ſubtus tomentoſo-aureis, fructu ovato monoſpermo. Chryſophyllum 2. *Brown. jam.* 171.
India occidentalis. ♄.

microcarpum. 1–2. C. foliis ovatis glabris, ſubtus pubeſcentibus, baccis obliquis oblongis monoſpermis.
Hiſpaniola. ♄.

rugoſum. 2–3. C. foliis oblongis acuminatis utrinque glabris, fructu acuminato rugoſo.
Jamaica. ♄.

BUMELIA. (XLIII.)

Cor. 5-fida: *Nectario* 5-phyllo.
Drupa 1-ſperma.

(pone *Sideroxylon.*)

nigra. 1. B. ramis virgatis patentibus, foliis terminalibus oblongo-lanceolatis glabris, margine undulatis, ramulis floriferis. Achras 6. *Brown. jam.* 201.
Jamaica. ♄.

pallida. 2 B. ramis erectis, foliis terminalibus ellipticis obtuſis, floribus confertis lateralibus.
Jamaica. ♄.

retuſa. 3. B. foliis oppoſitis cuneato-ovatis retuſis rigidis, floribus confertis axillaribus. Achras 7. *Brown. jam.* 201.
Jamaica. &c. ♄.

montana. 4 B. foliis ſparſis alternis oblongis apice obtuſis, floribus axillaribus pedunculatis.
Jamaica. ♄.

ſalicifolia. 5. B. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, floribus confertis axillaribus & lateralibus. Achras ſalicifolia *Linn.*

rotundifolia. 6. B. foliis ſuborbiculatis marginatis venoſis coriaceis utrinque glabris.
India occidentalis. ♄.

pentagona. 7. B. foliis lanceolatis acuminatis nitidis, floribus axillaribus, drupis pentagonis. *
India occidentalis, Inſ. S. Vincent. ♄.

RHAMNUS.

ellipticus. 12–13. R. inermis, floribus hermaphroditis ſub 3-gynis, fructibus trilocularibus, foliis ellipticis integris, umbellis axillaribus.
Rhamnus. *Brown. jam.* 172. 1. tab. 29. f. 2.
Jamaica. ♄.

ſphæroſpermus. 12–13. R. inermis, floribus hermaphroditis racemuloſis, baccis ſubrotundis 3-locularibus pellucidis, foliis oblongis ſerratis glabris.
Jamaica. ♄.

RUYSCHIA. Jacq.

Calyx 5-phyllus, bractea clauata ſubjecta.
Cor. reflexa. Stylus nullus.
Fructus polyſpermus.
(Inter *Celaſtrum & Evonymum.*)

Cluſiæfolia. 1. R. foliis obovatis integris avenüs; floribus bractea ſolitari. * Ruyſchia Cluſiæfolia. *Jacq. am.* 75. t. 51. 2.
India occidentalis. ♄.

Souroubea. 2. R. foliis obovatis emarginatis, apice denticulatis venoſis; floribus bracteis tripartitis. * Souroubea gvianenſis. *Aubl. gvian.* p. 244. fig.
Gviana. ♄.

ITEA.

Cyrilla. 2. I. foliis lanceolatis integris membranaceis. Cyrilla racemiflora. *Linn.*
Jamaica. ♄.

HIR-

HIRTELLA.

triandra. 2. H. foliis oblongis acuminatis, racemis compoſitis laxis, floribus triandris.
Hirtella americana. *Jacq. amer.*
Jamaica, Domingo. ♄.

paniculata. 3. H. foliis ellipticis hirſutis nitidis ſubcoriaceis, racemis erectis, floribus 5-dris. *
Cayenna. ♄.

HEDERA.

pendula. 3. H. foliis ovato-lanceolatis integris, pedunculis longisſimis pendulis.
Jamaica. ♄.

nutans. 4. H. foliis ellipticis coriaceis, umbellis nutantibus hæmiſphæricis.
Jamaica. ♄.

ACHYRANTHES.

altisſima. 7-8. A. caule ſuffruticoſo ſcandente, paniculis terminalibus axillaribusque ramoſis. *Jacq. amer.* 81. Celoſioides *Loefl. it.* 301. Celoſia. 2. *Brown. jam.* Blitum. *Sloan.* h. 1. p. 142. t. 91. f. 2. Amaranthus. *Plum. ſpec.* 6.
India occidentalis. ♄.

GARDENIA.

Genipa. 6-7. G. inermis, foliis oblongo-lanceolatis, pedunculis axillaribus multifloris, corollis hypocrateriformibus, tubo abbreviato. *
Genipa americana. *Linn. Fig. Plum.*

armata. 7-8. G. ſpinis ramulorum terminalibus quaternis, laciniis calycinis linearibus cuneiformibus, floribus confertis.
Muſſenda ſpinoſa *Linn. Jacqv.*

Randia. 7–8. P. (ſpinoſa) ſpinis ramorum decusſatis, foliis ſubrotundis, corollis hypocrateriformibus, dentibus calycinis lanceolato-ſubulatis. Randia aculeata. *Linn. Brown. jam.* 143. t. 8. f. 1.

mitis. (b.) ſubinermis, foliis ſubovalibus. Randia mitis. *Linn.*

ECHITES.

domingenſis. 3–4. E. pedunculis racemoſis, foliis cordato-ovatis, rigidiuſculis, ſubtus diſcoloribus, caule volubili. E. domingenſis. *Jacqv. ic. rar. Coll.* 1. p. 73. *India occidentalis.* ♄.

aſperuginis. 4–5. E. pedunculis racemoſis, folliculis filiformibus; foliis oblongis acutis, ſuperne aſperis, caule volubili. Apocynum *Plum. ic.* XXVII. *India occidentalis, Jamaica, Domingo.* ♄. ?

circinalis 6–7. E. pedunculis axillaribus multifloris articulatis, laciniis corollæ undulatis; foliis ellipticis, caule volubili. *Hiſpaniola.*

floribunda. 6–7. E. racemis corymboſis, foliis ovatis acuminatis, nervis paralellis, ramis erectiuſculis. *Jamaica.* ♄.

TABERNÆMONTANA.

diſcolor. 5–6. T. foliis oppoſitis ouato-lanceolatis, pedunculis axillaribus bifloris. *Jamaica.* ♄.

DIGYNIA.

CYNANCHUM.

criſpiflorum. 3–4. C. caule volubili, foliis ſubtus villoſis oblongis cordatis; ſinu clauſo, petalis apice criſpis. Periploca florum diviſuris circinnatis et criſpis. *Plum. ic.* 216. f. 1. *India occidentalis, Jamaica.*

parvi-

parviflorum. 12–13. C. caule volubili filiformi, foliis ovatis apice ſubulatis, umbellis ſubſeſſilibus. Periploca foliis ovatis, etc. *Plum. ic.* 215. f. 1. *India occidentalis.*

ASCLEPIAS.

viminalis. 4–5. A. caule ſuffruticoſo volubili filiformi, foliis oppoſitis lanceolatis glabris, umbellis lateralibus multifloris. Aſclepias. 3. *Brown. jam.* 183. Apocynum *Sloan. Hiſt.* t. 131. Cynanchum. *Plum. ic.* 27. f. 2. ? *Jamaicâ.*

MICROTEA. (XII. a.)

Calyx 5-phyllus; patens. *Cor.* nulla. *Drupa* ſicca, echinata. (ante *Salſolam.*)

debilis. 1. MICROTEA. * *St. Chriſtopher.* ☉.

CELTIS.

aculeata. 2–3. C. foliis cordato-ovatis, apice obtuſis ſubintegris glaberrimis, ramis aculeatis. Rhamnus Igvaneus. *Jacq. am.* 74. 1. *Hiſpaniola.* ♄.

micranthus. 4. C. foliis oblique cordatis ovato-lanceolatis ſerrulatis ſuperne ſcabriuſculis. Rhamnus micranthus. *Linn.* Zizyphus arboreſcens. *Brown.*

lima. 5. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis oblique cordatis ſerratis ſuperne ſcaberrimis. Loti arboris folio auguſt. arbor baccifera. *Sloan. h.* 2. p. 80. Muntingia folio ulmi aſpero. *Plum. gen.* p. 47. ? *India occidentalis.* ♄.

ROCHEFORTIA. (XLIII.)

Calyx 5-partitus. *Cor.* infundibuliformis, fauce aperta. *Peric.* 2-loculare, polyſpermum. (poſt *Schreberam.*)

cuneata. 1. R. foliis cuneiformibus obovatis integris.
ovata. 2. R. foliis ovatis emarginatis.
Jamaica. ♄. ♄.

DICHONDRA. Forſt. (XLV.)

Calyx 5-partitus. *Cor.* rotata, 5-partita.
Capſulæ duæ.
(inter *Namam* & *Hydroleam.*)

ſericea. 1. D. foliis ſubtus ſericeis.
Jamaica. ⊙.

HYDROLEA.

trigyna. 2. H. ſpinoſa, foliis oblongis hirſutis, floribus trigynis axillaribus. * Campanula americana ſpinoſa & hirſuta, flore patulo & ſeſſili cæruleo. *Houſt. mſc.*
India occidentalis.

HYDROCOTYLE.

hirſuta. 3–4. H. hirſuta, foliis reniformibus lobatis crenatis, floribus verticillatis verticillis quadrifloris.
Hiſpaniola.

PANAX.

attenuata. 1–2. P. foliis 3-natis 5-natiſue, foliolis ovatis attenuatis crenatis, caudice arboreſcente. *
India occidentalis. ♄.

TRIGYNIA.

VIBURNUM.

villoſum. 2–3. V. foliis integerrimis ovatis, ſubtus incano-villoſis.
Jamaica. ♄.

STA-

STAPHYLEA.

occidentalis. 1–2. S. foliis duplicato pinnatis, capſulis 3-gonis, ſeminibus ſolitariis, caule arboreo. *Sloan.* h. t. 220. f. 1. *Pluk. mant.* t. 269. f. 1. *Jamaica* ♄.

EVOLVOLUS.

ſericeus. 4–5. E. foliis lanceolatis ſesſilibus ſubtus ſericeis, pedunculis brevibus unifloris. Convolvolus erectus herbaceus ſubhirſutus, foliis linearibus, pedunculis brevibus. *Brown. jam.* 153. 3. t. 10. f. 3. *Jamaica.*

PENTAGYNIA.

ARALIA.

capitata. 1–2. A. arborea, foliis ſimplicibus ellipticis integerimis, paniculis terminalibus, floribus ſesſilibus capitatis. *Jacq. am.* 89. 2. t. 61. *India occidentalis.* ♄.

ſciodaphyllum. 3–4. A. arboreſcens, petiolis pedatis, foliis umbellatis terminalibus petiolatis, foliolis aliis centralibus, ſpicis longisſimis nutantibus. Sciodaphyllum. *Brown. jam.* 195. t. 19. f. 1. 2. *Jamaica.* ♄.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

HEPETIS. (X)

Calyx 3-partitus. *Cor.* 3-petala.
Capſula ſemiſupera, 3-locularis.
Sem. mutica.
(inter *Tillandſiam* & *Burmanniam.*)

anguſtifolia. 1. HEPETIS.
Jamaica.

BROMELIA.

bracteata. 4-5. B. foliis ſerrato-ſpinoſis, bracteis ovato-lanceolatis, ſcapo elongato, racemo compoſiſito, racemulis ſubdiviſis floribus ſeſſilibus. Aloë americana arboribus adnaſcens. C. *mſc.* 35. *fig.*
Jamaica. ♃.

paniculigera. 4-5. B. foliis ſerrato-ſpinoſis, bracteis lanceolatis, racemo compoſito, racemulis ſubdiviſis, floribus pedunculatis.
India occidentalis. ♃.

TILLANDSIA.

faſciculata. 5-6. T. ſpicis imbricatis lateralibus diſtichis, foliis lanceolato-ſubulatis erectis ſtrictis. *fig. Plum.*
Jamaica. ♃.

nutans. 5-6. T. ſcapo ſubnudo, panicula nutante, foliis radicalibus ovato-lanceolatis membranaceis.
Jamaica. ♃.

flexuoſa. 5-6. T. ſcapo ſubdiviſo, ſpicis laxis flexuoſis, ſpiculis diſtichis remotiuſculis, foliis lineari-lanceolatis reclinatis. *Jacq. am.* 92. t. 63. (Tillandſia tenuifolia.)
Jamaica. ♃.

cane-

caneſcens. 7–8. T. foliis linearibus erectis caulem æquantibus incanis ; ſpicis ſubternis.
Jamaica. ♃.

anguſtifolia. 7–8. T. foliis lineari-lanceolatis rectis glabris, caulem ſuperantibus, ſpicis ſparſis faſciculatis.
Jamaica. ♃.

TRADESCANTIA.

monandra. 4–5. T. diffuſa, foliis ovatis acuminatis, floribus monandris umbellulatis, involucello 4-phyllo.
Hiſpaniola. ⊙.

multiflora. 4–5. T. erecta, ramoſa, foliis cordatis margine vaginisque ciliatis, pedunculis congeſtis, floribus umbellatis 3-andris.
Jamaica.

cordifolia. 4–5. T. repens, lævis, foliis cordatis, pedunculis elongatis multifloris.
Jamaica. ⊙.

Zanonia. 1–2. T. erecta, lævis, pedunculis ſolitariis geniculatis multifloris. Commelina Zanonia. *Linn.*

Spathacea. 7–8. T. acaulis, foliis ſeſſilibus, ſcapis radicalibus.
India occidentalis, Campechia. ♃.

PONTEDERIA.

azurea. 2–3. P. foliis ſubrotundo-ellipticis, baſi incraſſatis, floribus ſpicatis. * Pontederia 1. *Brown. jam.* 195.
Jamaica.

limoſa. 3–4. P. foliis cordato-ovatis, ſpathis lateralibus unifloris, floribus triandris. Nympheæ affinis planta paluſtris aqvatica, flore hexapetalo ſtellato cæruleo. *Sloan. jam.* h. I. t. 149. f. 1.
Jam. Hiſpaniola.

THRINAX.

PALMA. *Cal.* 6-dentatus. *Cor.* nulla.
Stigma emarginatum. *Bacca* 1-ſperma.
(pone *Calamum.*)

parviflora. 1. THRINAX. Corypha 1. *Brown. jam.* 190.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

COCOS.

acicularis. 4. C. ſpinoſa tota, caudice frondibus foliolisque: ſpinis ſetaceis.
Palma pinnis inferne vaginantibus, caudice tereti aculeatisſimo. *Brown. jam.* 343. 4.
Palma ſpinoſa minor caudice gracili. *Sloan. h.* II. 124.
India occidentalis, Jamaica. ♄.

PRINOS.

montana. 3. P. foliis ovatis margine ſerratis, floribus hexandris, pedunculis axillaribus.
Jamaica. ♄.

ſideroxyloides. 4. P. foliis ſubrotundis integerrimis. *
Montſerrat. ♄.

LORANTHUS.

emarginatus. 5–6. L. racemis axillaribus ſimplicibus, foliis cuneatis ovatis emarginatis.
Hiſpaniola. ♄.

parvifolius. 8–9. L. pedunculis axillaribus trifidis, pedicellis unifloris, foliis ovatis integris.
Jamaica. ♄.

pauciflorus. 8–9. L. pedunculis trichotomis foliis brevioribus, foliis obovatis.
Jamaica. ♄.

HILLIA. Linn. (xxx.)

Calyx dupplex: *inferus* 6-phyllus.
Corolla longisſima, contorta.
Capſula 2-locularis, 2-valvis, coronata.
Semina pappoſa.

tetrandra. 2. H. corollis quadrifidis tetrandris, laciniis ovatis, foliis obovatis.
Jamaica. ♄.

longiflora. 1. H. *corollis 6-fidis, laciniis lanceolatis revolutis, foliis ovatis acutis.* Hillia Paraſitica. *Linn. Jacq.*

GUE-

GUETTARDA.

rugoſa. 2. G. foliis ſubcordatis ovatis acutis, ſubtus tomentoſis ſuperne ſcabris, floribus hexandris.* *India occidentalis.* ♄.

elliptica. 3. G. foliis ellipticis pubeſcentibus, floribus tetrandris. *Jamaica.* ♄.

membranacea 4. G. foliis ovatis acuminatis membranaceis, ſubhiſpido-ſcabris, floribus tetrandris. *Dommingo.* ♄.

TRIGYNIA.

SMILAX.

oblongata. 4–5. S. caule aculeato angulato, foliis oblongis acuminatis glabris trinerviis, nervis ſubtus aculeatis. *India occidentalis.* ♄.

RAJANIA.

anguſtifolia. 2–3. R. foliis lineari-lanceolatis, baſi rotundatis. *Hiſpaniola.* ♄.

ovata. 2–3. R. foliis ovatis acuminatis trinerviis. *Hiſpaniola.*

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

PISONIA.

ſubcordata. 1–2. P. inermis, foliis cordato-ſubrotundis, fructibus ſiccis ſubclavatis 5-gonis, angulis apice muricatis. *
India occidentalis, *Antigua*. ♄.

nigricans. 1–2. P. inermis, foliis ovatis acuminatis, floribus cymoſis erectis, fructibus baccatis.
Piſonia inermis. *Jacq.* 275. 2.
Jamaica. ♄.

coccinea. 1–2. P. inermis, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis terminalibus laxis, floribus nutantibus, fructibus baccatis.
Hiſpaniola. ♄.

CLAS-

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

RHEXIA.

leucantha. 6. R. foliis oppoſitis cartilagineo-denticulatis coriaceis nitidis; ramulis tetragonis, floribus terminalibus decandris.
Jamaica. ♄.

purpurea. 7. R. foliis oppoſitis denticulatis coriaceis, ramulis teretibus, floribus axillaribus decandris.
Jamaica. ♄.

HYPELATE. Brown.

POLYGAM. *Calyx* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Stigma deflexum, trigonum.
Drupa monoſperma.
(pone *Melicoccam.*)

trifoliata. 1. HYPELATE. *Brown. jam.* 207. 1.
Cytiſus arboreus, foliis obtuſis glabris, foliorum — *Sloan.* h. 2. 33.
Jamaica. ♄.

CUPANIA. Linn. (XXIII. c.)

Calyx 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Petala apice cucullata.
Stylus trifidus.
Capſula 3-locularis. *Sem.* ſolitaria.
(ante *Alophyllum.*)

tomentoſa. 2. C. foliis pinnatis obovatis retuſis inferne ferrugineo-tomentoſis. Trigonis tomentoſa. *Jacq. am.* 102. 1.
Hiſpaniola. ♄.

glabra. 3. C. foliis pinnatis ovatis obtuſis crenatis glabris. Cupania. *Brown. jam.* 178.
Jamaica. ♄.

ſapo-

ſaponarioides. 4. C. foliis pinnatis oblongis integris, ſubtus ſcabris. *
India occidentalis. ♄.

ALOPHYLLUS.

rigidus. 2. A. foliis ſimplicibus denticulato ſpinoſis, floribus racemoſis.
Hiſpaniola. ♄.

racemoſus. 3. A. foliis ternatis, floribus racemoſis.
Hiſpaniola. ♄.

Cominia. 4. A. foliis ternatis, floribus paniculatis.
Rhus comminia. *Linn.* Baccifera indica 3-folia, fructu rotundo 1-pyreno. — *Sloan.* h. 2. 100. t. 208. f. 1.
Jamaica. ♄.

HEDWIGIA.

Calyx 4-dentatus. *Cor.* 4-fida.
Stylus nullus.
Capſula tricocca. *Sem.* nux.
(Inter *Gvaream & Amyridem.*)

balſamifera. 1. HEDWIGIA.
Bois cochon. *Nicolſ. Hiſt. St. Doming.* 169.
Hiſpaniola. ♄.

FUCHSIA.

involucrata. 3. F. floribus involucratis.
Jamaica. ♄.

VACCINIUM.

meridionale. 12-13. V. floribus racemoſis, foliis ovatis crenato-ſerratis ſempervirentibus, caule arboreo.
Jamaica. ♄.

DIOSPYROS.

tetraſperma. 6. D. foliis membranaceis nitidis cuneiformibus, baccis tetraſpermibus.
Jamaica. ♄.

DAPH-

DAPHNE.

Lagetto. 10–11. D. ſpicis paniculatis terminalibus, foliis ovatis acutis. *Brown. jam.* 371. t. 31. f. 5. Laurifolia arbor. *Sloan. h.* 2. 22. t. 168. 1. 2. 3. 169. 1. Bois dentelle. *Nicolſ. Doming.* 172. t. 1. f. 1, 2, 3, 4, 5.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

tinifolia. 11–12. D. racemis compoſitis erectis, floribus terminalibus confertis foliis oblongis. Laurus americana. *Mill.*
Jamaica. ♄.

occidentalis. 11–12. D. pedunculis axillaribus, floribus terminalibus umbellulatis dioicis, foliis alternis lanceolatis glabris.
Jamaica. ♄.

VALENTINIA.

Calyx 5-partitus, coloratus, patens.
Corolla nulla.
Capſula baccata, 1-locularis 4-ſperma.
(pone *Dodonæam.*)

Ilicifolia. 1. VALENTINIA.
Malpighia aqvifolii amplioribus foliis. *Plum. ic.* 167. f. 2.
Ilex, foliis aqvifolii americana. *Pluk. phyt.* 196. f. 3.
Hiſpaniola, Cuba. ♄.

DIGYNIA.

WEINMANNIA.

hirta. 1–2. W. foliis pinnatis: foliolis ovatis ſerrato-crenatis, ſubtus racemiſque hirſutis.
Windmannia. *Brown. jam.* 212.
Jamaica. ♄.

TRIGYNIA.

COCCOLOBA.

nivea. 3-4 C. foliis ellipticis acuminatis venoſis ſupra nitidis, racemis erectiuſculis. C. nivea *Jacq. am.* 115. t. 78.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

PAULINIA.

Veſpertilio. 12-15. P. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis inciſis, petiolis nudis, capſulis pedicellatis, alis horizontalibus lanceolatis. *
India occidentalis. ♄.

divaricata. 9-10. P. foliis 2-ternatis, foliolis ovatis acutis ſubintegris, petiolis nudis, paniculis divaricatis, alis capſularum ovatis.
Jamaica. ♄.

CARDIOSPERMUM.

grandiflorum. 3. C. foliis pubeſcentibus, capſulis acuminatis maximis lævibus.
Jamaica. ♄.

CLAS-

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

LAURUS.

montana. 4–5. L. foliis 3-plinerviis ovato-acuminatis perennantibus, floribus racemoſo-paniculatis. *Jamaica.* ♄.

exaltata. 11–12. L. foliis ovato-lanceolatis venoſis coriaceis perennantibus planis; racemis erectis compoſitis, calyce cyathiformi perſiſtente. *Jamaica.* ♄.

triandra. 11–12. L. foliis lato-lanceolatis perennantibus planis; floribus triandris, fructu calyce tecto. *Jamaica.* ♄.

coriacea. 11–12. L. foliis ovatis acuminatis planis venoſis nitidis coriaceis, racemis erectis foliis brevioribus. *Jamaica.* ♄.

Leucoxylon. 11–12. L. foliis oblongo-lanceolatis planis perennantibus, racemis foliis brevioribus, calycibus incraſſatis verrucoſis. Laurus *Brown. jam.* 214. 2. *Jamaica*, &c. ♄.

membranacea. 11–12. L. foliis oblongis acuminatis venoſis convexis coriaceo-membranaceis, ramis racemisque erectis, folio brevioribus. *Jamaica, Hiſpaniola.* ♄.

patens. 11–12. L. foliis ovato-lanceolatis planis membranaceis, racemis erectis diffuſis foliis longioribus. *Jamaica.* ♄.

pendula. 11–12. L. foliis oblongis venoſis membranaceis perennantibus, racemis laxis, fructubus pendulis, calycibus deciduis. Laurus. 3. *Brown. jam.* 214. ♄.

floribunda. 11–12. L. foliis ovato-lanceolatis planis membranaceis, floribus racemoſo-paniculatis laxis terminalibus. *Jamaica.* ♄.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

SOPHORA.

monoſperma. 3–4. S. foliis impari-pinnatis, pinnis 5-jugis; leguminibus monoſpermis, caule arboreo.* Glycine 3. *Brown. jam.* 298.
India occidentalis. ♄.

BAUHINIA.

porrecta. 7–8. B. floribus ſub-10-dris; foliis cordatis, lobis porrectis acutis trinerviis, petalis lanceolatis. Bauhinia non aculeata folio amplio-ri & bicorni. *Plum. gen.* 23. *ic.* 32. t. 44. f. 2. Bauhinia. 1. *Brown. jam.* Sennæ ſpuriæ — *Sloan.* j. 150. h. 2. 51.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

CASSIA.

ſericea. 10–11. C. foliis ſub 4-jugis ovatis hirſutis, glandula ſubulata inter foliolos, pedunculis 4-floris, leguminibus 4-gonis. C. ſericea. *Mill. dict.*
Jamaica.

lineata. 14–15. C. foliis 5-jugis oblongiuſculis ſubtus pubeſcentibus æqvalibus, glandula obſoleta ſub infimis; pedunculis unifloris.
Jamaica. ♄.

virgata. 28–29. C. foliis decemjugis ovato-lanceolatis villoſis, glandula petiolari pedicellata; pedunculis unifloris fol. longioribus.
Jamaica.

TRI-

TRICHILIA.

ſpondioides. 1–2. T. foliis impari-pinnatis ſubhirſutis, pinnis ſub-10-jugis, inferioribus majoribus, racemis axillaribus. T. ſpondioides. *Jacq. am.* 128. *Sloan* h. 2. 103. t. 210. 2. 3. *Jamaica, Hiſpaniola.* ♄.

pallida. 2–3. T. foliis impari-pinnatis membranaceis, racemis axillaribus terminalibuſque, floribus octandris, filamentis villoſis, capſulis 2–valvibus. *Hiſpaniola.* ♄.

moſchata. 2–3. T. foliis pinnatis, pinnis alternis, racemis compoſitis, floribus ſub 10–dris 1–petalis, fructubus 1–ſpermis. Laurus folio breviore, flore racemoſo minore — *Sloan.* h. 2. p. 21. t. 166. f. 2. *Jamaica.* ♄.

MELIA.

ſempervirens. 1–2. M. foliis bipinnatis, foliolis rugoſiuſculis ſubſeptenis. M. Azedarach. b. *Linn.*

OCHNA. Linn. (LII.)

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Antheræ* ſubſeſſiles. *Drupæ* receptaculo incraſſato ſubrotundo carnoſo inſertæ.

(inter *Quaſſiam & Fagoniam.*)

nitida. 2. O. calycibus corollæ æqvalibus, drupis receptaculo ſuperimpoſitis, foliis ellipticis ſerratis. *India occidentalis.* ♄.

Iabotapita. 1. O. *petalis calyce 3-plo majoribus, drupis receptaculo immerſis.* O. Iabotapita. *Linn.*

QUASSIA.

excelſa. 2–3. Q. floribus hermaphroditis 5–dris paniculatis; foliis impari-pinnatis, foliolis oppoſitis, petiolatis, petiolo nudo. *Jamaica.* ♄.

TERMINALIA.

latifolia. 1–2. T. foliis obovatis ſubſerratis, drupis carnoſis. Arbor maxima, forte prunifera - *Sloan. hiſt.* 130.
Jamaica. ♄.

arbuſcula. 1–2. T. foliis ovato-lanceolatis integris pubeſcentibus, ramis dichotomis, racemis erectis.
Jamaica. ♄.

SAMYDA.

tomentoſa. 4–5. S. floribus octandris, (*Caſearia*) foliis ovatis ſerratis ſubtus tomentoſis.
Jamaica. ♄.

villoſa. 2–3. S. floribus decandris, (*Samyda*) foliis oblongis ſubſerratis baſi obliqvis ſericeis ſubtus villoſis; pedunculis ſolitariis axillaribus.
Jamaica. ♄.

glabrata. 2–3. S. floribus decandris, foliis ovato-lanceolatis integris nitidis, pedunculis axillaribus unifloris.
Jamaica. ♄.

ſpineſcens. 3–4. S. floribus decandris terminalibus, foliis lanceolato-ovatis obtuſis crenatis glabris, ramis patulis ſpineſcentibus.
Hiſpaniola. ♄.

MELASTOMA.

* *Decandræ, foliis trinerviis.*

procera. M. arborea, foliis trinerviis ſubdenticulatis glabris; racemo terminali, ſpicis ſimplicibus erectis, calycibus truncatis.
Melaſtoma foliis oblongis etc. *Plum. ic.* 142. f. 1.
Jamaica. ♄.

patens. M. fol. 3-nerv. ſubdenticulatis cordatis hirſutis; racemo terminali patulo, floribus diſtinctis dodecandris. M. umbellata. *Mill. dict.*
Jamaica. ♄.

rigida.

rigida. M. fol. 3-nerv. ſubdenticulatis ovatis ſubcordatis rigidis poſtice ſcabris; paniculis terminalibus ferrugineo-hirſutis.
Jamaica. ♄.

qvadrangularis. M. fol. 3-nerv. integris, ovato-lanceolatis glabris nervis coloratis, ramis qvadrangularibus; racemo ſtricto terminali.
Jamaica. ♄.

ſcandens. M. fol. 3-nerv. denticulatis ovatis acutis glabris, racemo terminali, ſpicis ſubſecundis; caule ſcandente.
Jamaica. ♄.

montana. M. fol. 3-nerv. denticulatis oblongis acutis glabriuſculis, racemo terminali ſpicis patulis, petalis retuſis, calyce truncato.
Jamaica. ♄.

ornata. M. fol. 3-nerv. integris rigidis ſupra hiſpidis, ſetis adpresſis, ſubtus incanis; umbellis 4-fidis terminalibus paucifloris, capſulis hiſpidis. *
Jamaica. ♄

trinervia. M. fol. 3-nerv. absque marginali, oblongis baſi apiceque attenuatis integris, utrinque glabris tenuioribus; racemis ſimpliciuſculis terminalibus.
Jamaica. ♄

ramiflora. M. fol. 3-nerv. integris ovato lanceolatis ſcabriuſculis; ramis floriferis, floribus pedunculatis ſubconfertis.
Jamaica. ♄.

**.) *Decandræ, triplinerviæ.*

praſina. M. fol. 3-plinerviis integerrimis lato-lanceolatis glabris, panicula terminali patentisſima.
M. lævigata. *Aubl. gvian.* c. *fig.*
Jamaica, Hiſpaniola etc. ♄.

***) *Decandræ*, 5 *nerviæ*.

argentea. M. foliis 5-nerviis ſub denticulatis ovatis glabris, inferne tomentoſis candidis; paniculis terminalibus patentibus.
Groſſularia fructu arbor maxima etc. *Sloan.* H. 2. 84. t. 199. f. 1.
India occidentalis. ♄.

elata. M. fol. 5-nerv. ſerrato-denticulatis oblongis coriaceis, ſubtus ferrugineo-tomentoſis; paniculis terminalibus patentibus, floribus ſeſſilibus.
Jamaica. ♄.

Tamonea. M. fol. 5-nerv. oblongo-lanceolatis acutis integris, ſubtus tomentoſo-incanis; racemis compoſitis terminalibus, racemulis brachiatis, bracteis geminis floribus ſubjectis.
Tamonea gvianenſis. *Aubl. gvian.* 441. t. 175. Groſſulariæ fructu arbor maxima — *Sloan.* H. 2. p. 84. *Pluk. phyt.* t. 264. f. 4.
India occidentalis. ♄.

albicans. M. fol. 5-nerv. integris ovatis acutis ſupra glabris, inferne tomentoſis albido-ferrugineis; racemis terminalibus erectis, floribus confertis ſeſſilibus.
Jamaica. ♄.

impetiolaris. M. fol. 5-nerv. denticulatis ſubſeſſilibus oblongis acuminatis coriaceis ſubtus tomentoſo-ferrugineis; paniculis terminalibus axillaribusque erectis.
India occidentalis. ♄.

ſplendens. M. fol. 5-nerv. integris oblongis acuminatis utrinque glabris, ſuperne nitidis; paniculis terminalibus erectis.
Melaſtoma foliis ovatis, etc. *Plum. ic.* 140.
Hiſpaniola. ♄.

coriacea. M. fol. 5-nerv. cartilagineo-denticulatis ovatis rugoſis glabris coriaceis, ramis petiolisque ſtrigoſis, ramis paniculæ tetragonis. *
Montſerrat. ♄.

ſtrigi-

ſtrigilloſa. M. fol. 5-nerv. ſubdenticulatis ſubcordatis acuminatis, ſuperne ſtrigoſo-piloſis ſubtus tomentoſis; racemis axillaribus ſolitariis floribus pedicellatis confertis.
India occidentalis. ♄.

**** *Octandræ, foliis trinerviis.*

faſcicularis. M. foliis 3-nerviis integris ovatis acutis ſcabris, ramis floriferis, floribus breviter pedunculatis confertis.
Jamaica. ♄.

anguſtifolia. M. foliis 3-nerviis lineari-lanceolatis integris ſubtus incanis, ramis virgatis; paniculis terminalibus, floribus erectis.
India occidentalis. ♄.

micranthus. M. fol. 3-nerviis denticulatis oblongis acutis glabris; racemis axillaribus reclinatis, floribus acuminatis.
Jamaica. ♄.

capillaris. M. fol. 3-nerviis ſubdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis glabris; pedunculis capillaribus trifloris axillaribus.
Jamaica. ♄.

rubens. M. fol. 3-nerviis denticulatis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, ramis petiolisque coloratis; racemo terminali, floribus confertis dioicis. Melaſtoma. 8. *Brown. jam.* 219.
Jamaica. ♄.

purpuraſcens. M. fol. 3-nerviis integris oblongis acutis ſtriatis glaberrimis; racemis lateralibus patulis, floribus diſtinctis.
Jamaica. ♄.

glabrata. M. fol. 3-nerviis ſubdenticulatis ovatis acutis glabris coriaceis; pedunculis terminalibus ſolitariis unifloris.
Jamaica. ♄.

alpina. M. fol. 3-nerviis integris ovatis coriaceis glabris; pedunculis ſimpliciter trichotomis; floribus diſtinctis.
India occidentalis. ♄.

hirſuta. M. foliis 3-nerviis ſubdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis hirſutis; pedunculis axillaribus trifloris divaricatis.
Jamaica. ♄.

hirtella. M. fol. 3-nerviis, margine hiſpido-piloſis, pedunculis breviſſimis axillaribus trifloris.
Jamaica. ♄.

microphylla. M. fol. 3-nerviis ſubdenticulatis ovatis obtuſis ſuperne hiſpidis infra tomentoſis; pedunculis trifidis axillaribus. *
India occidentalis. ♃.

tetrandra. M. fol. 3-nerviis integris oblongis acuminatis baſi emarginatis glabris convexiuſculis; racemo erecto terminali, floribus tetrandris.
Jamaica. ♄.

***** *Octandræ, triplinerviæ.*

virgata. M. fol. 3-plinerviis integris ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis; ramis floriferis, racemis decuſſatis diffuſis ſparſis.
Jamaica. ♄.

Æleagnoides. M. fol. 3-plinerviis integris lato-lanceolatis ſubtus albido-tomentoſis; pedunculis terminalibus trichotomis, floribus ſolitariis. *
India occidentalis. ♄.

****** *Octandræ, 5-nerviæ.*

umbroſa. M. foliis 5-nerviis denticulatis lato-ovatis acuminatis utrinque hirtis; ramulis floriferis, racemis dichotomis patentibus; ramis petioliſque hirſutis.
St. Chriſtoffer. ♄

piloſa. M. fol. 5-nerviis denticulatis oblongis acutis ſubtus hirſutis; racemis lateralibus hirſutis.
Jamaica ♄.

hiſpida. M. fol. 5-nerviis ſubdenticulatis ovatis acutis, ſuperne ſtrigoſo-hirſutis ſubtus reticulato-tomentoſis, paniculis terminalibus divaricatis.
India occidentalis. ♄.

aqua-

aquatica. M. foliis 5-nerviis cordatis acutis crenulatis, ſuperne hirtis ſubtus lævibus; paniculis terminalibus trichotomis diffuſis. *
M. aqvatica. *Aubl. gvian.* p. 430. t. 169.
India occidentalis. ♄.

PETALOMA.

Calyx cyathiformis 5-dentatus.
Petala 5 calyci inter dentes inſerta.
Bacca 1-locularis 1-4-ſperma.
(inter *Murrayam & Melaſtomam.*)

myrtilloides. 1. P. pedunculis ſolitariis unifloris, foliis ſubſeſſilibus ovatis attenuatis baſi obliquis.
Myrti folio etc. *Sloan. Hiſt.* 2. p. 78. t. 187. f. 3.
India occidentalis. ♃.

Mouriri. 2. P. pedunculis corymboſis axillaribus, foliis petiolatis ovatis acuminatis, baccis 4-ſpermibus. *
Mouriri gvianenſis. *Aubl. gvian.* 452. t. 180.
Gviana. ♄.

ANDROMEDA.

faſciculata. 5-6. A. pedunculis aggregatis, corollis .... foliis alternis ovato-lanceolatis obtuſis ſubcrenulatis coriaceis.
Jamaica. ♄.

Iamaicenſis. 5-6. A. pedunculis aggregatis, corollis ovatis diaphanis; foliis alternis lato-lanceolatis obtuſis integris, ſubtus cinereis membranaceis.
Jamaica. ♄.

octandra. 5-6. A. pedunculis aggregatis, corollis cylindricis 4-fidis; foliis alternis ovato-lanceolatis integris membranaceis.
Jamaica. ♄.

EPIGÆA.

cordifolia. 2. E. foliis cordatis ſubrotundis ſerratis convexis hiſpidis rigidis, corollis ovatis. *
Guadeloupe. ♄.

repens. 1. E. *foliis cordato-ovatis integris planis aſperis; corollis cylindricis.* E. repens. *Linn.*

CLETHRA.

trifolia. 2. C. arborea, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis ſubtus incanis; racemis paniculatis ſpicæformibus tomentoſis.
Tinus occidentalis. *Linn.* Volkameria. *Brown. jam.* 214. t. 21. f. 1. *Sloan. Hiſt.* 2. 86. t. 198. f. 2.
Jamaica. ♄.

Alnifolia. 1. C. *fruticoſa, foliis obovato-lanceolatis ſerratis glabris, racemis ſimplicibus ſpicæformibus.* C. alnifolia. *Linn.*

STYRAX.

glabrum. 2. S. foliis oblongis ſubſerratis utrinque glabris; pedunculis axillaribus ſimplicibus confertis multifloris, floribus nutantibus.
India occidentalis, Vincenti. ♄.

officinalis. 1. S. *foliis ellipticis integris ſubtus tomentoſis.* S. officinalis. *Linn.*

TRIGYNIA.

MALPIGHIA.

faginea. 3–4. M. foliis oblongo-ovatis integris ſubtus ſericeo-nitidis; pedunculis 3-partito-umbellatis. *
India occidentalis. ♄.

lucida. 3–4. M. foliis obovatis cuneiformibus integerrimis enerviis nitidis, pedunculis terminalibus multifloris. *
India occidentalis. ♄.

coriacea. 6–7. M. foliis ovatis acutis integris utrinque glabris; racemis terminalibus ſpicatis.
Malpighia. 6. *Brown. jam.* Tiliæ affinis laurifolia — *Sloan. jam.* h. 2. 163. f. 1.
Jamaica. ♄.

BANI-

BANISTERIA.

longifolia. 3-4. B. foliis oblongis acuminatis rigidis nitidis, panicula terminali, ramis patentiſſimis.
India occidentalis. ♄.

TRIOPTERIS.

Citrifolia. 2. T. foliis oblongis integris utrinque glabris; racemis axillaribus ramis dichotomis, capſulis 4-alaribus.
Acer ſcandens tricoccos fol. citri. *Plum. ic.* t. 16.
Jamaica. ♄.

rigida. 3. T. foliis ſubrotundis acutis marginatis lineatis coriaceis; racemis compoſitis axillaribus, capſulis trialatis.
Hiſpaniola. ♄.

ERYTHROXYLON.

ſqvamatum. 3. E. foliis ovatis acuminatis, ramulis ſqvamoſis, drupis acutis. *
India occidentalis. ♄.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

TRIUMFETTA.

rhombeæfolia. 3–4. T. foliis rhomboideis, ſummis lanceolato-ovatis; floribus completis.
T. rhomboidea. *Jacq. am.* 147. t. 90.
India occidentalis. ♄.

LYTHRUM.

cordifolium. 8–9. L. foliis oppoſitis ſubſeſſilibus cordatis acutis ſcabris, racemis terminalibus axillaribusque, floribus decandris.
Hiſpaniola. ♄.

ciliatum. 8–9. L. foliis oppoſitis petiolatis ovatis glabris, margine ciliatis; racemis terminalibus, floribus ſubſecundis decandris.
Jamaica. ♄.

TRIGYNIA.

EUPHORBIA.

glabrata. 13–14. E. inermis, fruteſcens ramoſa, foliis oppoſitis ovatis acutis glabris integerrimis.
Peplis fruticoſa marittima geniculata. *Sloan.* h. 2. 198.
Jamaica. ♄.

obliterata. 33–34. E. umbella trifida; foliis oblongis trapezoideis ſerratis pubeſcentibus, altera baſeos parte obliteratis. E. obliterata. *Jacq. am.* 151. 5.
Jamaica. ♄.

punicea. 51–32. E. umbella 5-fida, trifida, involucellis ovalibus acuminatis coloratis, capſulis glabris; foliis lanceolato-cuneiformibus ſubtus glaucis.
Jamaica ♄.

CLAS-

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

CACTUS.

pendulus. 14–15. C. pendulus, ramis verticillatis teretibus glabris muticis. Caſſytha polyſperma *Mill. ic.* Cactus. *Brown. jam.* 238. Viſcum.—*Sloan. h.* 2. p. 93.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

alatus. 22–23. C. prolifer, enſiformis compreſſus crenatus. Cactus 5. *Brown. jam.* 237. Opuntia non ſpinoſa. *Sloan.* h. 3. 159. 2.
Jamaica. ♄.

PSIDIUM.

montanum. 1–2. P. foliis oblongis acuminatis crenulatis nitidis, pedunculis multifloris.
Pſidium 2. *Brown. jam.* 238.
India occidentalis. ♄.

Gvineenſe. 1–2. P. foliis ovatis integris ſubtus tomentoſis, pedunculis 3–floris.
Inſula principis Africes, in Domingo cultâ. ♄.

MYRTUS.

alpina. 1–2. M. pedunculis ſolitariis terminalibus unifloris brevisſimis; foliis ovatis, ramulis quaternis faſtigiatis, caule arboreo.
Jamaica. ♄.

procera. 1–2. M. pedunculis confertis axillaribus unifloris; foliis ovatis acuminatis planis glabris, ramis virgatis, caule arboreo.
Hiſpaniola. ♄.

buxi-

liguſtrina. 1–2. M. pedunculis ſolitariis ramoſisque terminalibus unifloris; foliis lanceolatis obtuſis convexis lucidis.
Hiſpaniola. ♄.

crenulata. 1–2. M. pedunculis ſolitariis axillaribus ſub 3-floris; foliis ſubrotundis crenulatis glabris.
Hiſpaniola. ♄.

lineata. 7–8. M. floribus axillaribus ſubſeſſilibus, foliis ovatis acuminatis rigidis lineatis ſubtus incanis.
Hiſpaniola. ♄.

cordata. 7–8. M. floribus axillaribus lateralibusque ſubſeſſilibus, foliis ſeſſilibus cordatis ovatis nitidis.
India occidentalis ♄.

buxifolia. 7–8. M. racemulis brevisſimis confertis axillaribus; foliis cuneatis oblongis obtuſis convexiuſculis.
India occidentalis. ♄.

glabrata. 7–8. M. racemulis brevisſimis axillaribus multifloris; foliis ellipticis acuminatis convexis coriaceis glaberrimis.
Hiſpaniola. ♄.

diſticha. 7–8. M. pedunculis axillaribus multifloris foliis brevioribus; foliis diſtichis deflexis ovato-lanceolatis, ramis patentibus.
Jamaica. ♄.

monticola. 7–8. M. pedunculis multifloris brevisſimis axillaribus ſolitariis; foliis ovatis obtuſatis planis glaberrimis.
Jamaica. ♄.

axillaris. 7–8. M. pedunculis multifloris brevisſimis axillaribus confertis; foliis ovatis acuminatis nitidis planis.
Jamaica. ♄.

Gregii. 7–8. M. pedunculis multifloris axillaribus; foliis ovatis ellipticis acutis integerrimis ſubtus pubeſcentibus. *
India occidentalis, *Antigua.* ♄.

virgul-

virgultoſa. 8-11. M. pedunculis axillaribus terminalibusque paniculatis, pedicellis remotis decusſatis unifloris; foliis lato-lanceolatis attenuatis, ramis virgatis, caule arboreo.
Myrtus fol. ovato-lanceolatis. *Plum. ic.* 208. f. 1.
Jamaica. ♄.

ſplendens. 8-11. M. pedunculis axillaribus ſolitariis trichotomis; foliis ellipticis acuminatis planis venoſis ſcarioſis nitidis, ramis virgatis.
Hiſpaniola. ♄.

acris. 13-14. M. pedunc. axillaribus terminalibusque corymboſis trichotomis foliis longioribus; foliis ellipticis convexis coriaceis venoſis punctatis, caule arboreo. * M. caryophyllata. *Jacq. obſ.* 2. 1. Caryophyllus. 1. *Brown. jam.* 247. *Pluk. alm.* 188. t. 155. f. 3.
b. *pedunculis trichotomis terminalibus; foliis ſubrotundo-ellipticis convexis coriaceis aveniis punctatis utrinque nitidis.* Myrtus cotini folio. *Plum. ic.* t. 208. f. 2.
India occidentalis. ♄.

fragrans. 13-14. M. pedunculis axillaribus trichotomis ſimplicibusque; foliis ovatis convexiuſculis ſubcoriaceis punctatis glabris, caule arboreo.
Eugenia montana. *Aubl. gvian.* 495. t. 195.
Jamaica. ♄.

CALYPTRANTHES. (xix. a.)

Calyx truncatus, ſuperus, operculo calyptriformi, deciduo. *Cor.* nulla.
Bacca monolocularis 1-4-ſperma.
(pone *Myrtum.*)

Chytraculia. 1. C. arborea, pedunculis terminalibus paniculatis trichotomis tomentoſis; foliis ovatis apice attenuatis. Myrtus Chytraculia. *Linn.*

Zuzygium. 2. C. arboreſcens, pedunculis axillaribus trichotomis patulis; foliis ovatis obtuſis, ramis dichotomis. Myrtus zuzygium. *Linn.*

rigi-

rigida. 3. C. arboreſcens, pedunculis ſolitariis axillaribus ſubtrifloris; foliis ovatis acutis convexis aveniis rigidis.
Jamaica. ♄.

PRUNUS.

occidentalis. 3–4. P. floribus racemoſis, racemis lateralibus; foliis perennantibus eglanduloſis oblongis acuminatis integris, utrinque glabris.
India occidentalis. ♄.

ſphærocarpa. 3–4. P. floribus racemoſis, racemis axillaribus; foliis ſempervirentibus eglanduloſis integris nitidis, drupis ſubrotundis.
Myrti folio arbor — *Sloan.* h. 2. p. 79. t. 193. f. 1.
Hiſpaniola. ♄.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

TERNSTRÖMIA. L. (XXXVII. b.)

Cal. 5-partitus. *Cor.* monopetala urceolata, 5 partita.

Bacca ſicca, polyſperma.

elliptica. 2. T. foliis ellipticis acutis integris, pedunculis lateralibus. *
India occidentalis, Guadeloupe, Vincentii. ♄.

meridionalis. 1. T. *fol. obovatis integris, pedunculis terminalibus.* T. meridionalis *Linn. ſuppl.*
India occidentalis. ♄.

punctata. 3. T. foliis oblongis integris ſubemarginatis margine punctatis, ped. axillaribus. *
Taonabo punctata. Aubl. gvian. 571. t. 228.

dentata. 4. T. foliis oblongis acuminatis dentato-ſerratis, ped. axillaribus lateralibusque. *
Taonabo dentata. Aubl. gvian. 569. t. 227.
Gviana. ♄. ♄.

CAPPARIS.

toruloſa. 7–8. C. pedunculis ſubbifloris teretibus terminalibus, foliis lanceolato-ovalibus, ſubtus albido-punctatis; ſiliquis teretibus linearibus toruloſis. *Breynia* 2. *Brown. j.* 246.
Jamaica. ♄.

longifolia. 7–8. C. pedunculis —, foliis lineari-lanceolatis, ſubtus farinoſo-punctatis. *Pluk. am.* t. 327. f. 6.
Jamaica. ♄.

POSSIRA. Aublet. (XXV.)

Cal. 4-partitus.
Petalum unicum, laterale.
Legumen 1-loculare, 2-valve.

ſimplex. 1. P. foliis ſimplicibus oblongis.
Inſulæ caribeæ. ♄.

triphylla. 2. P. foliis ternatis, petiolis marginatis. *
Poſsira arboreſcens *Aubl. gvian.* 934. t. 353.
Gviana, Cayenna. ♄.

SLOANEA. Linn.

Cor. nulla. *Cal.* 1-phyllus.
Antheræ filamentis infra apicem adnatæ.
Capſula echinata 3-6 loc. 3-6 valvis.
Sem. bina, arillo baccato.
(ante *Trewiam.*)

Maſſoni. 2. S. foliis cordato-ellipticis, ſtipulis linearibus; calyce 5-partito, ſetis capſulæ longisſimis.*
Inſulæ caribeæ, Chriſtoph. etc. ♄.

dentata. 1. S. *foliis ovatis acutis, ſtipulis cordato 3-angularibus ſerratis.* S. dentata. *Linn. Plum.*

ſinemarienſis. 3. S. foliis ſubrotundo-ovatis integris, capſulis ovatis ſetoſis ex apice dehiſcentibus. *.
S. ſinemarienſis *Aubl. gvian.* 354. t. 212.
Inſul. caribeæ, Chriſtoph. Gviana. ♄.

APEIBA. Marcg. Aubl. (XXXVII.)

Calyx 5-phyllus. *Cor.* 5-petala.
Capſula multilocularis, echinata.
Loc. polyſperma.
(inter *Bixam & Sloaneam.*)

Tibourbou. 1. A. foliis acute-ſerratis hirſutis.
Apeiba Tibourbou. *Aubl. gvian.* 538. t. 213.
Sloanea *Loefl. it.* 311. Apeiba. *Marcgr. braſ.* 123. f. 124.
India occidentalis, Tobago, Gviana. ♄.

Petoumo. 2. A. foliis ellipticis acutis ſerrulatis ſubtus incanis. * *Aubl. gvian.* 543. t. 215.

aſpera. 3. A. foliis integerrimis ſubtus pubeſcentibus, fructu compresſo. * *Aubl. gvian.* 545. t. 216.

lævis. 4. A. foliis integerrimis, utrinque glabris, fructu aſpero depreſſo. * *Aubl. gvian.* 541. t. 214.
Gviana. ♄. ♄. ♄. †).

LIGHTFOOTIA.

☿. *Calyx* 4-phyllus. *Cor.* nulla.
Stigma ſeſſile. *Bacca* umbilicata, 1-locularis, 3-6-ſperma.

♂. ♀. } Hermaphrodit.

(inter *Prockiam & Corchorum.*)

ſerrata. 1. LIGHTFOOTIA.
Montſerrat. ♄.

LAETIA.

Guidonia. 12. L. floribus apetalis, pedunculis unifloris terminalibus, foliis oblongis acuminatis ſerratis pubeſcentibus.
Guidonia. *Brown. jam.* 249. t. 29. f. 4.?
Jamaica. ♄.

Thamnia. 1-2. L. floribus apetalis, pedunculis multifloris ſubdiviſis axillaribus, foliis oblongis acutis ſubcrenatis nitidis. Thamnia. *Brown. jam.* 245.
Jamaica. etc. ♄.

ACIDOTON. (XXXVIII.)

DIOIC. } MONOIC. } ♂. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla.
Stam. receptaculo globoſo affixa.
♀. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* nulla.
Stylus 3-fidus. *Capſula* tricocca.

†). A. *petoumo, aſperam & laevem* ex Aubletio mutuavi, characteribus ſpecificis impoſitis ſecundum ſpecimina Aubletii in Muſeo Bankſiano aſſervata.

urens. 1. ACIDOTON.
Urtica urens arborea, foliis oblongis anguſtis. *Sloan. j.* 38. h. 1. p. 125. t. 83. f. 1.
Jamaica. ♄.

HEDYOSMUM.

MONOIC. ♂. *Amentum* antheris tectum.
Per. *Cor.* *Fil.* nulla.
♀. *Cal.* 3-dentatus. *Cor.* nulla.
Stylus unicus, triqueter.
Bacca trigona, monoſperma.

nutans. 1. H. caule fruticoſo, ramis laxis, foliis lanceolatis acuminatis.
Jamaica. ♄.

arboreſcens. 2. H. caule arboreſcente, ramis ſtrictis erectis, foliis ovato-lanceolatis.
Jamaica. ♄.

MARILA. (XXXVII.)

Cal. 5 phyllus. *Cor.* 5-petala.
Capſula 4-locularis, polyſperma.
Stigma ſimplex.
(inter *Laetiam* & *Elæocarpum.*)

racemoſa. 1. MARILA. *
India occidentalis, Montſerrat, Chriſtoph. ♄.

LEGNOTIS. (XIX. b.)

Cal. 5-fidus. *Petala* 5 receptaculo inſerta, lacera.
Capſula trilocularis.
(pone *Elæocarpum.*)

elliptica. 1. L. foliis ellipticis, floribus pedicellatis.
Jamaica. ♄.

Caſſipourea. 2. L. foliis ovatis, floribus ſeſſilibus. *
Caſſipourea gyianenſis. *Aubl. gv.* 529. t. 211.
Gviana. ♄.

ERO.

EROTEUM. (XXXVII. b.)

Calyx 5-phyllus. *Cor.* 5 petala. *Stylus* 3-fidus. *Bacca* exſucca, 3-locularis, polyſperma.
(pone *Theam.*)

Theæoides. 1. E. foliis ovato-lanceolatis ſerrato-dentatis, floribus axillaribus ſolitariis.
Jamaica. ♄.

undulatum. 2. E. foliis elliptico-lanceolatis acuminatis ſerratis, floribus confertis axillaribus. *
India occidentalis; Chriſtopher, Montſerrat, Guadeloupe etc. ♄.

MIMOSA.

alba. 1–2. M. inermis, foliis pinnatis 3-jugis, pinnis æqualibus ovatis acuminatis, petiolo ſubmarginato. *
Cayenna. ♄.

Laurina. 2–3. M. inermis, foliis pinnatis 2-jugis, pinnis ovatis nitidis ſubæqualibus, petiolo lineari angulato, ſpicis axillaribus ſolitariis.
India occidentalis, Chriſtopher. ♄.

comoſa. 24–25. M. inermis, arborea, foliis 2-pinnatis 3-jugis, pinnis (9–10-jugis) ovalibus baſi retuſis, floribus paniculatis monadelphis.
Jamaica. ♄.

villoſa. 28–29. M. inermis, foliis 2-pinnatis ſub 5-jugis; pinnis ovatis petiolisque villoſis, floribus globoſis polyandris, caule fruticoſo.
India occidentalis. ♄.

mangenſis 30–31. M. ſpinis ſolitariis brevibus, foliis 2-pinnatis ſub 9-jugis, ſpicis globoſis axillaribus ſolitariis. M. mangenſis. *Jacq. am.* 267. 5.
India occidentalis, Jamaica ♄.

juliflora. 31–32. M. ſpinis ſtipularibus geminis, foliis 2-pinnatis 2-jugis glandula interſtinctis; ſpicis pendulis, leguminibus compreſſis.
Mimoſa. 2. *Brown. jam.* 251.
Jamaica. ♄.

TRIGYNIA.

HOMALIUM. Jacq. (XLII.)

Calyx 6-7-partitus. *Cor.* 6-7-petala.
Stam. 21 per tria aggregata.
Per. uniloculare, polyſpermum.
(ante *Delphinium.*)

racemoſum. 1. H. foliis ſerratis, racemis axillaribus terminalibusque, floribus pedunculatis. Homalium racemoſum. *Jacq. am.* 170. t. 183. f. 72.
Jamaica. ♄.

Racoubea. 2. H. foliis dentatis coriaceis, racemis terminalibus, floribus ſubſeſſilibus. *
Racoubea gvianenſis. *Aubl. gvian.* p. 590. t. 236.
Gviana. ♄.

BEGONIA.

ſcandens. 2. B. ſcandens, radicans; foliis cordato-ovatis rectis obtuſe ſerratis, floribus paniculatis.
Begonia glabra *Aubl. gvian.* 916. t. 349. 13.
B. nivea maxima — *Plum. ſp.* 21 *ic.* 45.
India occidentalis, *Jamaica.* ♃.

purpurea. 3. B. caulescens, erecta; foliis cordatis ovato-lanceolatis, obſolete ſerratis obliquis; floribus paniculatis.
B. obliqva. b. *Spec. plant. Plum. ic.* 45. f. 3.
Rumex ſylveſtris ſcandens — *Brown. jam.* 203.
India occidentalis. ♄.

POLYGYNIA.

MAGNOLIA.

Plumieri. 1-2. M. foliis perennantibus ovato-ſubrotundis utrinque glabris.* Magnolia. *Plum. gen. p.* 38. 7. *ic. not. Burm.* p. 161.
Lucia, Martinica, Gvadeloupe. ♄.

UVARIA.

lanceolata. 1-2. U. foliis lanceolatis integris floribus axillaribus ſolitariis, ramis virgatis. Arbor foliis ovatis. etc. *Brown. jam.* 370. 11.
Jamaica. ♄.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

TEUCRIUM.

inflatum. 15–16. T. foliis oblongis acuminatis inæqvaliter ſerratis pubeſcentibus, ſpicis ſeſſilibus terminalibus, calycibus inflatis villoſis.
Teucrium. *Brown. jam.* 257.
India Occidentalis, Jamaica. ♃.

STACHYS.

patens. 6–7. S. ramoſisſima, ramis filiformibus patentibus, foliis lanceolatis ſerratis glabris, floribus ſubverticillatis.
Hiſpaniola. ♄.

CLINOPODIUM.

capitatum. 2–3. C. foliis planis glabris, capitulis axillaribus pedunculatis. Clinopodium. 1. *Brown. jam.*
Meliſſa altisſima globularia. *Plum. ic.* t. 163. f. 2.
Sideritis. *Sloan. jam.* 65. h. 1. p. 174. t. 109. f. 2.
Scabioſæ affinis. *Pluk. alm.* 355. t. 222. f. 7.
Hyptis. *Jacq. ic.*
Jamaica. ☉.

PHLOMIS.

Martinicenſis. 9–10. P. involucris ſetaceis, verticillis ſubgloboſis, calycibus recurvis, lacinia ſup. ſubulata longisſima, foliis ovato-oblongis villoſis. *
Jacq. ic. Clinopodium martinicenſe. *Jacq. am.* 160. t. 177. f. 75.
Martinica. etc.

THY-

THYMUS.

Brownei. 1–2. S. foliis orbiculatis crenatis, floribus pedunculatis axillaribus. Thymus 1. *Brown. jam.* 259.
Jamaica. ☉. ♃.

SCUTELLARIA.

purpuraſcens. 11–12. S. foliis petiolatis cordato-ovatis dentatis, racemis nudis terminalibus, corollis labio utroque triſido. *
Guadeloupe.

ANGIOSPERMIA.

GESNERIA.

Craniolaria. 3. G. foliis cuneatis oblongis dentato-laciniatis; pedunculis terminalibus, corollis campanulatis. Craniolaria fruticoſa. *Linn.* Geſneria arboreſcens amplo flore — *Plum. gen.* 27. t. 137.
Hiſpaniola. ♄.

grandis. 3. G. foliis lato-lanceolatis longisſimis denticulatis ſuperne hirtis infra ſcabris; pedunculis terminalibus, caule arboreſcente.
Jamaica. ♄.

ſcabra. 3. G. foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſcabris, pedunculis axillaribus, corollis cylindricis recurvis.
Jamaica. ♄.

corymboſa. 1–2. G. foliis ovatis acutis ſerratis ſcarioſis aſperis, pedunculis multipartitis, floribus corymboſis.
Jamaica. ♄.

exſerta. 3. G. foliis ovato-lanceolatis crenatis glabris, pedunculis trifloris, genitalibus corolla duplo longioribus, capſulis ovatis.
Jamaica. ♄.

calycina. 3. G. foliis lanceolato-ovatis acuminatis ſerratis glabris, ped. 3-floris, genitalibus corolla longioribus, calycibus campanulatis, capſ. cylindricis.
Jamaica. ♄.

ventricoſa. 3. G. foliis ellipticis acuminatis crenatis glabris, ped. ſub 4-floris, laciniis calycis ſubulatis elongatis, corollis ventricoſis. *
Jamaica, Montſerrat, Dominica. ♄.

pulchella. 3. G. herbacea, foliis ternatis ovatis acutis ſerratis villoſis, pedunculis axillaribus unifloris. Achimenes 2. *Brown. jam.* 270. t. 30. f. 1.
Columnea erecta. *Lamarck. Encycl.* 2. p. 66. n. 2.
Jamaica. ⊙.

pumila. 3. G. acaulis, foliis ovato-cuneiformibus crenatis ſubſeſſilibus, ped. ſubbifloris foliis brevioribus.
Jamaica.

BRUNFELSIA. Linn. (xl.)

Calyx 5 dentatus. *Cor.* tubo longiſſimo. *Bacca* 1-locularis polyſperma, *conceptaculo* maximo.
(pone *Beſleriam.*)

undulata. 2. B. foliis lanceolato-ovatis utrinque attenuatis, petiolis breviſſimis, corollis tubo curvo, limbo undulato.
Jamaica. ♄.

americana. 1. B. *foliis ellipticis acuminatis, petiolis longioribus, corollis tubo erecto, limbo integro.* Linn.
India occidentalis, Jamaica. ♄.

BIG-

BIGNONIA.

longiſſima. 1-2. B. arborea, foliis ſimplicibus oblongis acuminatis, floribus 2-dris, ſiliquis filiformibus, ſeminibus lanatis. B. longisſima *Jacq. am.* 182. t. 176. f. 78. *Plum. ſp.* 5. *ic.* 57. Bignonia 2. *Brown. jam.* 264. Bignonia Qvercus *Lamarck Encycl.* 417. 2.
India occidentalis. ♄.

alliacea. 4-5. B. foliis conjugatis: foliolis ellipticis integris coriaceis, pedunculis 5-floris axillaribus, calycibus integris. * B. alliacea *Aubl. gvian.* 659. 14. *Barr. Gall. æqvin.* 23.
India occidentalis. ♄.

echinata. 9-10. B. foliis inferioribus ternatis, ſuperioribus conjugatis, petiolis dichotomis cirrhoſis; fructibus echinatis. * B. echinata *Jacq.* h. 183. t. 176. f. 52. *Aubl. gvian.* 648. t. 263. 264.
India occidentalis. ♄.

CITHAREXYLON.

erectum. 1-2. C. ramis teretibus, racemis erectis terminalibus, calycibus dentatis. Citharexylon 5. *Brown. jam.* t. 28. f. 2.
Berberis fructu, arbor maxima — *Sloan.* h. 99. t. 206. f. 3. 4.
Jamaica. ♄.

ſubſerratum. 4. C. ramis 4-gonis, racemis axillaribus nutantibus, calycibus dentatis, foliis ellipticis ſubſerratis venoſis.
Hiſpaniola. ♄.

melanocardium. 4. C. ramis tetragonis, racemis terminalibus compoſitis, floribus tetrandris.
Citharexylon 2. *Brown. jam.* 265.

TANÆCIUM. (XXV.)

Calyx cylindraceus, truncatus.
Corolla tubuloſa, ſubæqvalis, 5-fida.
Rudimentum filamenti 5-ti.
Bacca corticoſa maxima.
(ante *Cal.* 2*fidos.*)

Jaroba

Iaroba. 1. T. foliis inferioribus ternatis, ſuperioribus geminatis, cirrhis interpetiolaribus terminalibus; caule ſcandente. Iaroba. *Marcgr. braſ.* 25. *Piſ.* 173. Creſcentia? 6. *Brown. jam.* 266. Cucurbitifera fruticoſa 3-folia *Sloan. jam.* 207. h. 2. p. 175.
Jamaica. ♄.

paraſiticum. 2. T. foliis ovatis coriaceis, caule ſcandente fruticoſo radicante. Creſcentia? 5. *Brown. jam.* 265.
Jamaica. ♄.

LANTANA.

ſtricta. 3–4. L. foliis oppoſitis oblongo-lanceolatis acutis, caule inermi; capitulis ſubrotundis, bracteis ovato-lanceolatis ſquarroſis.
Periclymenum rectum ſalviæ folio. *Sloan.* h. 2. 84. t. 195. 4.
Jamaica. ♄.

radula. 3–4. L. foliis oppoſitis ovatis acutis ſerratis rugoſis aſperis, ſubtus hirſutis, caule ſubinermi aſpero; capitulis oblongis, bracteis ovatis acutis.
India occidentalis. ♄.

LINDERNIA.

dianthera. 2. L. foliis petiolatis ovato-ſubrotundis ſubſerratis, caule repenti. Erinus procumbens. *Mill. dict.*
Hiſpaniola. ⊙.

BUCHNERA.

elongata. 1–2. B. foliis integris oppoſitis, calycibus piloſiuſculis, fructu longioribus.
Ageratum folio & facie Rapunculi. *Plum. ic.* 19. t. 17. Peripea paluſtris. *Aubl. guian.* 627. t. 253.
India occidentalis, Jamaica.

LIPPIA.

LIPPIA.

cymoſa. 5. L. floribus cymoſis, foliis ovatis ſubintegris. Spireæ congener ſpinoſa, folio ſubrotundo acuminato integro — *Sloan.* h. 2. 30. t. 174. f. 3. 4.

RUELLIA.

Blechioides. 1–2. R. foliis oblongis ſubdentatis glabris, ſpicis ovatis, floribus bracteis longioribus. *Jamaica.* ♄.

anguſtifolia. 1–2. R. foliis lineari-lanceolatis, ſpicis oblongis, bracteis ovatis hirſutis. * *India occidentalis.*

rupeſtris. ? R. acaulis, foliis petiolatis oblongis crenato-undulatis, ſcapis erectis multifloris. *Hiſpaniola.* ♃.

VITEX.

umbroſa. 3–4. V. foliis quinatis integerrimis, utrinque glabris, racemis compoſitis axillaribus. *Jamaica.* ♄.

divaricata. 2–3. V. foliis ternatis integerrimis utrinque glabris, paniculis dichotomis divaricatis. * *St. Crux, Chriſtopher.* ♄.

COLUMNEA. Linn.

Cal. 5-phyllus.
Cor. ringens, labio ſup. 3-partito, intermed. fornicata; ſupra baſin gibba.
Antheræ connexæ.
Capſ. 1-locularis. *Sem.* nidulantia.
(pone *Beſleriam.*)

hirſu-

hirſuta. 2. C. foliis ovatis acuminatis ſerratis ſuperne hirtis, foliolis calycinis denticulatis lanceolatis, corollisque hirſutis, labio ſuperiori bifido. Achimenes 1. *Brown. jam.* 270. t. 30. f. 3. Rapunculus fruticoſus — *Sloan.* h. 1. p. 157. t. 100. f. 1.
Jamaica. ♄.

hiſpida. 3. C. foliis ovatis obtuſis denticulatis hiſpido-hirſutis, foliolis calycis lanceolatis integris piloſis; caule piloſo ſcabro.
Jamaica. ♄.

rutilans. 4. C. foliis ovato-lanceolatis villoſis denticulatis; foliis calycis laciniatis, corollis villoſis, labio ſuperiori bipartito.
Jamaica. ♄.

ſcandens. 1. C. *foliis ovatis acutis integris ſubvilloſis, foliolis calycis integris, corollisque pubeſcentibus, labio ſuperiori indiviſo. Plum. gen.* 28. *ic.* 89. f. 1. Columnea ſcandens. *Linn. Jacq. hort.* III. 27. h. 48.

TAMONEA. Aublet. (XL.)

Cal. 5-ariſtatus. *Cor.* ringens, limbo 5-fido. *Nux* carnoſa 4-locularis. *Sem.* ſolitaria.
(pone *Pedalium.*)

ſpinoſa. 1. T. fructibus 4-ſpinoſis.
Verbena curasſavica *Linn.* Kæmpfera. *reliq. Houſt.* t. 2.
India occidentalis, Antigua, Curacao. ☉.

mutica. 2. T. fructibus muticis. * Tamonea ſpicata. *Aubl. gvian.* 660. t. 268.
Gviana, Cayenna. ☉.

CLAS-

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DIANDRIA.

OMPHALEA. LINN.

MONOIC. ♂. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* nulla. *Filamentum* columnare cui *antheræ* apice inſidentes.

♀. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* nulla. *Stigma* trifidum. *Capſula* carnoſa trilocularis.

axillaris. 3. O. racemis axillaribus; foliis diſtichis ovatis acuminatis nitidis petiolis breviſſimis, ſtipulis mucronatis, caule fruticoſo.
Jamaica. ♄.

cauliflora. 4. O. racemis caulinis baſi ſqvamoſis, foliis diſtichis oblongis acutis nitidis, caule arboreſcente.
Jamaica. ♄.

cordata. 1. O. *racemis compoſitis folioſis terminalibus, foliis ſparſis cordatis ſubtus villoſis, baſi biglanduloſis, caule ſcandente.* Omphalea diandra. *Linn.*

nucifera. 2. O. *racemis compoſitis folioſis terminalibus, foliis ſparſis oblongis glaberrimis baſi biglanduloſis, caule arboreo.* O. triandra. *Linn.*

TRIGYNIA.

GYMNANTHES. (XXXVIII.)

DIOIC. MONOIC. ♂. *Amentum* nudum. *Per.* O. *Cor.* O. *Stam.* pedicelli 3-partiti l. 3-chotomi antheriferi.

♀. *Amentum.* 1. *Germen* pedicellatum. *Cor.* O. *Stylus* 3-fidus. *Capſula* 3-cocca 3-locularis.
(pone *Iuniperum.*)

elliptica

elliptica. 1. G. dioica, ſtaminibus 3-partitis, fœmineis amentaceis.
Jamaica. ♄.

lucida. 2. G. monoica, ſtaminibus 3-chotomis, femineis ſolitariis pedicellatis.
Hiſpaniola. ♄.

MYRISTICA. (XVI.)

DIOIC. ♂. *Cal.* 3 fidus. *Cor.* nulla.
Filamentum columnare.
Antheræ terminales, coalitæ.
♀. *Cal.* 3 fidus. *Cor.* nulla.
Capſula ſupera, drupacea, bivalvis.
Nux macide involuta.

fatua. 3. M. foliis oblongo-lanceolatis, ſubtus pubeſcentibus, calycibus fructibusque villoſis.
Tobago. ♄

ſebifera. 2. M. foliis cordatis oblongis ſubtus fructibusque tomentoſis. * Virola ſebifera. *Aubl. gvian.* 904. t. 345.
Gviana. ♄.

aromatica. 1. M. *foliis ellipticis ſubtus pubeſcentibus, calycibus ovatis, fructibus lævibus.* †)

PEN-

†) Hæc vera eſt arbor *Nucis moſchatae*, cujus characterem ignoravit dum vixit Cel. a LINNÉ, in Suppl. plantarum a SONNERATIO forte deceptus. Flores mihi qvamplurimi viſi, ab Indiæ orientalis Banda & Isle de France allati, in Muſeo Ill. Jos. BANKS optime in ſpiritu vini asſervati; ideoque certior factus de fructificatione hac ſingulari, primum ab Equ. THUNBERGIO in Act. Holm. 1782. p. 46. delineata, licet Ille antheram unicam filamentum cingentem deſcripſit; Numerus antherarum in *M. aromatica* vix diſtingvendus, qvia ſulcis polliniferis asſimilantur, nec ut in M. *fatua* & *ſebifera* 3-magis diſtinctæ. AUBLETIUS quidem Virolam ſuam depinxit hexandram; qvod vero falſum & natura incongrum ex ſpeciminibus ipſius diligenter examinatis atteſtari posſum.

PENTANDRIA.

AYENIA.

lævigata. 1–2. A. foliis ovatis integris glaberrimis; germine pedicellato, nectario decemfido radiato.
Jamaica. ♄.

PASSIFLORA.

anguſtifolia. 8–9. P. foliis indiviſis ſubcordatis lanceolatis integris, petiolis 2-glanduloſis, floribus ſolitariis.
Jamaica. ♄.

oblongata. 16–17. P. foliis ellipticis, antice ſubtrilobis ſubtus punctatis, lobis acutiuſculis, intermedio breviori.
Jamaica. ♄.

parviflora. 18–19. P. foliis trilobis glabris; lobis ovatis integris, intermedio productiore, petiolis 2-glanduloſis; caule herbaceo.
Jamaica. ♃.

MELOCHIA.

venoſa. 3–4. M. pedunculis diſtinctis terminalibus multifloris, foliis ovatis ſerratis venoſis ſubtus tomentoſis, caule piloſo. Sida 17. *Mill. dict.*
Jamaica. ♄.

nodiflora. 4–5. M. floribus conglobatis axillaribus, capſulis globoſis, foliis ovatis acuminatis glabris. Abutilon fruticoſum — *Sloan.* h. 1. p. 219. t. 135. 2.
Jamaica. ♄.

lupulina. 4–5. M. racemis confertis axillaribus, calycibus inflatis membranaceis, foliis ovato-cordatis inciſo-ſerratis ſubtus tomentoſis.
Jamaica. ♄.

OCHROMA. (XXXVII. a.)

Cal. duplex: exterior 3-phyllus.
Antheræ connatæ, anfractuoſæ.
Capſula 5-locularis, polyſperma.
(pone *Melochiam.*)

Lagopus. 1. OCHROMA.
Hibiſcus 10. *Brown. jam.* 286. Cotonnier ſiffleux *Nicol. Doming.* p. 223.
Goſſypium l. Xylon arboreum *Pluk. alm.* t. 189. f. 2.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

OCTANDRIA.

ALCHORNEA. (XXXVIII.)

DIOIC. ♂ *Calyx.* 3-5-phyllus. *Cor.* nulla.
♀ *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* O.
Stylus 2-partitus.
Capſula baccata, 2-cocca.

latifolia. 1. ALCHORNEA.
Jamaica. ♄.

DECANDRIA.

HELICTERES.

jamaicenſis 1-2. H. foliis cordatis acutis ſerratis, fructu ovato acuto contorto. H. jamaicenſis *Jacq. am.* 235. t. 179. f. 99. Helicteres Iſora. b. *Linn.*
Jamaica. ♄.

IATROPHA.

divaricata. 2-3. I. foliis ovatis acuminatis integris glaberrimis, racemis divaricatis.
Jamaica. ♄.

DODECANDRIA.

STERCULIA.

Jvira. 1-2. S. hermaphrodita, foliis ovatis 3-lobisve, floribus paniculatis, capſulis qvinque. *
Ivira pruriens *Aubl. gvian.* 694. t. 279.
India occidentalis. ♄.

ACA-

ACALYPHA.

* *Monoicæ.*

Hernandifolia. A. ſpicis femineis longiſſimis, involucris cordatis ſerratis, maſculis diſtinctis aphyllis, foliis ſubcordatis ſerratis, petiolis longiſſimis.
Jamaica. ♄.

Corenſis. A. floribus femineis terminalibus diſtinctis involucris triphyllis, ſpicis maſculis axillaribus involucratis, foliis ovatis ſerratis. A. corenſis. *Jacq. am.* 254. t. 161.
India occidentalis. ♄.

lævigata. A. ſpicis femineis involucris multipartitis, ſpicis maſculis laxis aphyllis, foliis cuneato-ovatis acuminatis ſerrulatis glaberrimis.
Jamaica ♄.

elliptica. A. ſpicis femineis involucris germinibus brevioribus ovatis dentatis hirſutis; maſculis aphyllis laxis; foliis ellipticis acuminatis dentatis.
Jamaica. ♄.

reptans. A. ſpicis terminalibus erectis, floribus mixtis, femineis inferioribus, involucris cordatis ſerratis, maſculis aphyllis, foliis ovatis ſerratis, caule reptante. Urtica minor iners ſpicata. *Sloan. hiſt.* 1. 125. t. 82. f. 3.
Jamaica, Hiſpaniola.

tomentoſa. A. ſpicis femineis terminalibus ſolitariis, involucris multipartitis, maſculis erectis, foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſcabris ſubtus villoſo-tomentoſis.
Hiſpaniola. ♄.

anguſtifolia. A. floribus femineis ſubſeſſilibus terminalibus, involucris ſerratis, maſculis ſpicatis, foliis linearibus ſerratis.
Hiſpaniola. ♄.

** *Dioicæ.*

ſcabroſa. A. ſpicis femineis involucris cordatis inciſis, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis ſcabris.
Jamaica. ♄.

betulæfolia. A. floribus femineis axillaribus ſeſſilibus, involucris cordatis crenatis, maſculis ſpicatis, foliis ſubrotundis crenatis glabris.
Jamaica. ♄.

CROTON.

ſeſſiliflorum. 5–6. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis glabris, floribus ſeſſilibus axillaribus dioicis 5-dris.
Hiſpaniola. ♄.

globoſum. 5–6. C. foliis ovatis obtuſis integris, pedunculis geminis, floribus dioicis; fructibus globoſis echinato-hispidis.
Jamaica. ♄.

Eluteria. 5–6. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis ſparſis glabris ſqvamuloſis, ſubtus argenteis, caule arboreo; racemis compoſitis axillaribus.
Clutia eluteria Linn.

divaricatum. 8–9. C. foliis oblongis obtuſis ſerratis hirtis, baſi biglanduloſis, racemis terminalibus ſolitariis caule fruticoſo, ramis dichotomis divaricatis.
India occidentalis. ♄.

nitens. 9–10. C. foliis cordato-ellipticis acuminatis ſubintegris glabris ſupra nitidis, ſubtus punctatis argenteis; racemis axillaribus foliis brevioribus erectis.
Jamaica. ♄.

Laurinum. 9–10. C. foliis oblongis acutis integerrimis conſiſtentibus glabris, petiolis ſcabris foliisque ſubtus punctatis; racemis axillaribus longisſimis patulis; caule arboreſcente.
Jamaica. ♄.

pallens. 9–10. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis utrinque glabris, racemis ſolitariis erectis terminalibus; calycibus fructu majoribus. C. fruticoſum *Mill.*
India occidentalis. ♃.

macrophyllum. 9–10. C. foliis cordato-ſubrotundis acuminatis integris craſſis tomentoſis, ſubtus nervoſis. *
India occidentalis. ♃.

populi-

populifolium. 10–11. C. foliis lato-ovatis acuminatis ſerrato-dentatis ſub-hirtis, petiolis longitudine foliorum; racemis terminalibus erectis ſolitariis.
India occidentalis, Jamaica. ♃.

POLYANDRIA.

CAROLINEA.

inſignis. 2. C. foliis ſubſeptenatis, foliolis obovato-oblongis. *
Xiloxochitl flore capillaceo. *Hern. mex.* 68.
Tobago, Vera Cruz. ♄.

princeps. 1. C. *foliis ſubqvinatis, foliolis ovato-lanceolatis.*
C. princeps. *Linn.*

SIDA.

arguta. 14–15. S. foliis cordatis ſerratis apice attenuatis; caule virgato, pedunculis axillaribus filiformibus unifloris. *Mill. dict.*
Jamaica. ♄.

althææfolia. 16–17. S. foliis cordatis ſubangulatis obtuſis ſerrato-crenatis utrinque tomentoſis, roſtris ſeminum calyce brevioribus.
Althæa flore luteo, *Sloan.* h. p. 218. t. 136. f. 2.
Jamaica. ♄.

dumoſa. 13–14. S. foliis cordatis acuminatis ſerratis utrinque glabris, floribus paniculatis.
Jamaica. ♄.

procumbens. 3–4. S. foliis cordatis ovato-ſubrotundis ſerratis villoſis, caulibus procumbentibus hirſutis.
Hiſpaniola.

ALTHÆA.

corymboſa. 1–2. A. foliis ſimplicibus cordatis angulatisve glabris, pedunculis calycibusque piloſis, floribus corymboſis.
Hiſpaniola. ♄.

racemoſa. 1-2. A. foliis ſimplicibus cordatis ovatis ſerratis ſuperne ſcabris, racemo terminali erecto. Althæa 3. *Brown. jam.* 284. Alcea fruticoſa aqvatica *Sloan.* h. 221. t. 139. f. 2. Pavonia ſpicata. *Cavanilles diſſ.* 3. p. 136. t. 46. f. 1.
Jamaica. ♄.

HIBISCUS.

elatus. 10-11. H. foliis cordatis ſubrotundis integris; pedunculis brevisſimis unifloris, calyce 10-dentato. Hibiſcus 1. *Brown. jam.* 284 Malva arborea *Sloan.* h. 1. 95. t. 134. f. 2. 3.
Jamaica. ♄.

ACHANIA. (XXXVII. æ.)

Cal. duplex: *exterior* polyphyllus.
Cor. convoluta.
Bacca 5-ſperma.
(pone *Hibiſcum.*)

Malvaviſcus. 1. A. foliis ſcabriuſculis acuminatis, foliolis calycis exterioris erectis. Hibiſcus malvaviſcus *Linn.* Malva arborea *Sloan.* h. 1. 216. t. 136. f. 1.
Malvaviſcus arborea. *Cavanilles diſſ.* 3. p. 131. t. 48. f. 1.

piloſa. 2. A. foliis piloſis obtuſis acutisque.
Jamaica. ♄.

MYRODIA.

Calyx ſimplex, monophyllus.
Cor. 5 petala. *Piſt.* I.
Columna antherifera indiviſa.
Drupa ſicca: *Nuces* binæ.
(inter *Meſuam & Moriſonam.*)

turbinata. 1. M. foliis ellipticis, calycibus turbinatis intus ſubſericeis. *
Montſerrat, Lucia, Chriſtoph. ♄.

longi-

longiflora 2. M. foliis oblongis, calycibus cylindraceis intus villoſis, ſtaminum columna longisſima. * Qvararibea gvianenſis. *Aubl. gvian.* 692. t. 278. *Cavamill. diſs.* 3.
Gviana. ♄.

PINUS.

Occidentalis. 4–5. P. foliis 5-nis margine ſcabris longisſimis; conis oblongis, ſqvamis apice truncatis. Pinus foliis qvinis ſcabris. *Plum.* p. 154. t. 161.
Hiſpaniola. ♄.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

OCTANDRIA.

SECURIDACA.

virgata. 3. S. caule ſcandente, ramis virgatis, foliis ſubrotundis. *Securidaca* 1. *Brown. jam.* 287. Spartium alterum ſcandens, fructu alato, flore variegato. *Plum. H. mſs.* h. 2. p. 213. ic. 144. f. 1.
Hiſpaniola. ♄.

DECANDRIA.

AMERIMNON. Brown. (XXXII).

Calyx bilabiatus.
Legumen compreſſo-foliaceum 2-valve, dehiſcens. *Semina* aliqvot ſolitaria.
(poſt *Pterocarpum*).

Brownei. 1. A. inerme, foliis petiolatis alternis ſubcordato-ovatis, racemis compoſitis axillaribus lateralibusque. Amerimnon. 1. *Brown. jam.* 288. Tab. 31. f. 3. *Jacq. amer.* 199. t. 180. f. 58.
Jamaica. ♄.

Ebenus. 2. A. ſpinoſum, foliis ſubſeſſilibus aggregatis obovato-oblongis, pedunculis bifloris. Pterocarpus ſeſſilifolius *Linn.* P. buxifolius. *Murr.* Aſpalathus Ebenus *Linn.* Brya. *Brown. jam.* Spartium *Sloan.* h. 2. 30. t. 175. f. 1. Ebenus. *Pluk.* Spartium arboreſcens. *Mill. dict.*

TERAMNUS. (XXXII).

Carina minima, calyce recondita.
Stam. alterna; 5 ſterilia.
Stigma ſeſſile, capitatum.
(pone *Amorpham.*)

volubilis. 1. T. foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus. *Dolichos uncinatus. Linn.* Teramnus 1. *Brown. jam.* 290. Phaſeolus ſylveſtris minor, flore minori. *Sloan.* h. 1. p. 182.
Jamaica. ♄

uncinatus. 2. T. foliis oblongis obtuſis, ſubtus ſericeis.
Jamaica. ♄.

DOLICHOS.

roſeus. 31. D. caule repente adſcendente, foliolis ſubrotundis nitidis, floribus racemoſis, leguminibus dorſo 3-carinatis.
Dolichos maritimus repens. *Brown. j.* 293. 4.

luteus. 26-27. D. volubilis, floribus ſubſpicatis, leguminibus ſubcylindricis glabris, foliis ſubrotundo-rhombeis obtuſis integris glabris.
Jamaica. ♄.

GLYCINE.

phaſeoloides. 6-7. G. foliis ternatis, ſubtus villoſis, racemis terminalibus. Glycine 2. *Brown. jam.* 296. Phaſeolus florum ſpica pyramidata, ſemine coccineo, nigra macula notato. *Plum. Cat.* 12.
Jamaica, Domingo. ♄.

reticulata. 11-12. G. foliis ternatis oblongo-lanceolatis pubeſcentibus, ſubtus reticulato-venoſis, racemis axillaribus ſubſeſſilibus, leguminibus oblongis compreſſis.
Jamaica ♄.

CLITORIA.

multiflora. ? C. foliis pinnatis, foliolis oblongis ſubtus ſericeis, racemis axillaribus multifloris. *Domingo.* ♄.

GEOFFRÆA.

inermis. 2. G. inermis, foliolis lanceolatis. Geoffræa inermis jamaicenſis. *Wright. Act. Lond.* 1777. *vol.* 67. p. 512. t. 10. *India occidentalis, Jamaica.* ♄.

ſpinoſa. 1. G. *ſpinoſa, foliolis oblongis obtuſis.* G. ſpinoſa *Linn. Jacq.*

ROBINIA.

ſepium. 1–2. R. inermis, pedunculis racemoſis, partialibus bifloris; foliis impari-pinnatis, pinnis ovatis acuminatis. R. ſepium. *Jacq. am.* 211. *Hiſpaniola.* ♄.

HEDYSARUM.

adſcendens. 17–18. H. foliis ternatis ſubrotundis ſubtus pubeſcentibus, caule tereti, ramis declinatis adſcendentibus piloſis; racemis ſimplicibus erectis axillaribus. *Jamaica.* ♄.

ſupinum. 20–21. H. foliis ternatis ovatis obtuſiuſculis, ſubtus incano-villoſis, caule ramoſo procumbente; racemis ſimplicibus erectis terminalibus. Hedyſarum triphyllum ſupinum — *Sloan.* h. 185. t. 118. f. 2. *Jamaica.* ♄.

in-

incanum. 20–21. H. foliis ternatis ovatis acuminatis ſubtus incanis, caule tereti ramoſo erecto; racemis terminalibus erectis, legum. declinatis hirtis. H. caneſcens *Mill. dict.* Hedyſarum fol. 3-natis ovatis. *Plum. ic.* 149. f. 1.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

trigonum. 21–22. H. foliis ternatis ovatis acutis hirtis, caule ſcandente 3-quetro; racemis longiſſimis axillaribus, legum. tortuoſis inflexis. Hedyſarum. 7. *Brown. jam.* 301. H. intortum. *Mill. dict.*
Jamaica, Hiſpaniola.

ſcorpiurus. 25–26. H. foliis ternatis oblongis, ſubtus hirſutis, caulibus procumbentibus 3-gonis, racemis axillaribus, legum. teretiuſculis erectis. Hedyſarum. 9. *Brown. jam.* 301.
Hiſpaniola, Jamaica.

tortuoſum. 28–29. H. foliis ternatis ovali-oblongis obtuſis glabriuſculis, racemis erectis axillaribus, leguminibus tortuoſis compreſſis pubeſcentibus. Hedyſarum 8. *Brown. jam.* 301. Hedyſarum triphyllum — *Sloan.* h. 1. 184. t. 116. f. 2.
India occidentalis. ♄.

ſpirale. 28–29. H. foliis ternatis ovatis obtuſis glabris, caule ramoſiſſimo, ramis diffuſis; racemis laxis divaricatis, legum. ſpirali-tortuoſis. H. procumbens. *Mill. dict.*
Jamaica. ♄.

axillare. 29–30. H. foliis ternatis rhombeo-ſubrotundis, caule repente radicante, petiolis erectis; ſcapis axillaribus foliis longioribus. Hedyſarum 6. *Brown. jam.*
Jamaica, Domingo.

AESCHYNOMENE.

ſenſitiva. 2–3. AE. caule fruticoſo glabro, foliolis obtuſis, leguminibus lævibus obtuſis, ſtipulis acutis deciduis. * Hedyſarum arboreſc. foliis mimoſæ. *Plum. cat.* 1. *ic.* 149. *f.* 2.
India occidentalis. ♄.

GALE-

GALEGA.

toxicaria. 3-4. G. ſpicis terminalibus pedunculatis, leguminibus teretibus pedicellatis patentibus, caule foliolisque incano-tomentoſis. Cytiſus. 2. *Brown. jam.* 296.
Galega fruteſcens, fol. ſericeis. *Plum. ic.* 126. t. 235.
India occidentalis. ♄.

STYLOSANTHES.

Calyx tubulatus, longisſimus, corollifer.
Germen ſub corolla.
Legumen biarticulatum, hamatum.
(pone *Aeſchynomenem.*)

procumbens. 1. S. foliis ternatis acuminatis lineatis glabris, ſpicis multifloris, caule procumbente. Hedyſarum hamatum. a. *Linn.* Trifolium 1. *Brown. jam.* 298. Anonis non ſpinoſa major glabra — *Sloan.* h. 1. 178. t. 119. f. 2.
Jamaica, Hiſpaniola. &c.

viſcoſa. 2. S. foliis ternatis ovatis ciliatis hirſutis, ſpicis paucifloris, caule erecto.
Hedyſarum hamatum. b. *Linn.*
Trifolium 2. *Brown. jam.* Loto 5-phyllo ſiliqvoſo ſimilis, non ſpinoſa — *Sloan.* h. 1. 186. t. 119. f. 1.
Jamaica.

CLAS-

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

SYMPLOCOS.

Cal. 5-fidus ſuperus. *Cor.* 5-8-petala.
Stamina 4-plici ſerie tubo corollæ accreta.
Fructus (Drupa) 5-locularis, polyſperma.
(poſt *Hopeam*.)

octopetala. 2. S. floribus octopetalis.
Jamaica. ♄

martinicenſis. 1. S. *floribus 5-petalis.* Linn. Jacq.

CLAS-

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

SONCHUS.

agreſtis. 4-5. S. pedunculis tomentoſis multifloris, calycibus glabris, caule ſtriato, foliis inciſo-ſerratis ſeſſilibus.
Sonchus lævis *Sloan. cat.* 122. h. 255.
Jamaica. ⊙.

SPILANTHUS.

uliginoſa. 3-4. S. foliis ovato-lanceolatis crenatis, caule erecto dichotomo, pedunculis terminalibus, floribus radiatis.
Jamaica. ⊙.

BIDENS.

hirſuta. 10-11. B. foliis oppoſitis ovato-lanceolatis integris tomentoſo-hirſutis, caule ſcandenti fruticoſo, pedunculis oppoſitis divergentibus multifloris. Eupatorium jam. foliis oblongis, ſubtus — *Sloan.* h. 1. 257.
Jamaica. ⊙.

CACALIA.

ruderalis. 14-15. C. caule herbaceo ramoſo, foliis lanceolatis integris glaucis.
Kleinia ruderalis. *Jacq. am.* 215. t. 127.
Jamaica. ⊙.

ETHU

ETHULIA.

Struchium. 1–2. E. floribus axillaribus ſeſſilibus, omnibus trifidis. Struchium 1. *Brown. jam.* 312. t. 34. f. 2.
Jamaica. ☉.

EUPTATORIUM.

parviflorum. 1. E. fruticoſum, foliis ovato-lanceolatis ſerratis glabris, corymbis patentibus, calycibus trifloris.
Jamaica. ♄.

nervoſum. 17–18. E. foliis elliptico-lanceolatis attenuatis dentatis triplinerviis utrinque glabris, calycibus multifloris.
Jamaica. ♄.

rigidum. 17–18. E. foliis petiolatis ovatis acutis ſerrato-dentatis rigidis ſubtus ſcabris; caule ſubherbaceo.
Jamaica.

molle. 18–19. E. foliis petiolatis cordatis acutis ſubſerratis pubeſcentibus; caule herbaceo tomentoſo. Ageratum gvianenſe. *Aubl. gv.* 800. 3.
India occidentalis, Jamaica. ☉.

villoſum. 18–19. E. foliis oppoſitis decusſatis, ovatis acutis ſubſerratis ſubtus villoſo-tomentoſis, calycibus 8–15-floris, caule fruticoſo. Conyza fruticoſa ciſti odore — *Sloan* h. 1. 257. t. 161. f. 2.
Jamaica, Domingo. ♄.

cordifolium. 18–19. E. foliis cordatis ſerratis ſubtus tomentoſo-hirſutis, petiolis brevisſimis; corymbis ſubſeſſilibus, calycibus ſqvarroſis; caule fruticoſo.
Jamaica. ♄.

montanum. 18-19. E. foliis cordatis acutis denticulatis petiolatis ſcabris ſubtus hirſutis; corymbis patentibus, caule fruticoſo.
Jamaica. ♄.

LAVE-

LAVENIA. (XLIX. compoſ. E).

Receptaculum nudum.
Pappus 3-ariſtatus, apice glanduloſus.
Calyx ſubæqvalis. *Stylus* 2-fidus.
(inter *Eupatorium* & *Ageratum.*)

decumbens. 1. L. caule ſimplici decumbente, foliis ſubcordatis obtuſe ſerratis.
Cotula verbeſina. *Linn.*
Jamaica. ☉.

erecta. 2. L. *Caule ramoſo erecto, foliis ellipticis argute ſerratis.* Soland. *
Verbeſina Lavenia. *Linn.* Adenoſtema *Forſt.*

POLYGAMIM SUPERFLUA.

GNAPHALIUM.

albeſcens. 32–33. P. herbaceum, niveo-tomentoſum, foliis lineari-lanceolatis, caule erecto, inferne indiviſo, ramis terminalibus faſtigiatis, floribus confertis conicis.
Jamaica. ♄.

americanum. 37–38. G. herbaceum, foliis radicalibus lingulato-lanceolatis ſubtus niveis, caule ſimplici erecto tomentoſo, floribus ſpicatis lateralibusque ſeſſilibus confertis. Gnaphalium amer. *Mill. dict.* Gnaphalium ad ſtoechadem citrinam accedens. *Sloan. cat. jam.* 125.
Gnaphalium 1. *Brown. jam.* 318.
Jamaica. ☉.

CONYZA.

purpuraſcens. 15–16. D. foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſubtomentoſis, caule ſubherbaceo, inferne ſimplici ſuperne corymboſo, floribus ovatis.
Conyza 1. *Brown. jam.* 318.
Conyza major odorata — *Sloan.* h. 1. 258. t. 152. f. 1.
Jamaica. ☉.

rigida. 22–23. C. foliis petiolatis obovatis integris ſcabris ſubtus venoſis; ſpicis flexuoſis, floribus ſecundis geminatis. — *Plum. ic.* 14. f. 1.
Jamaica. ♄.

CALEA.

lobata. 3–4. C. corymbis congeſtis, foliis alternis ſuperioribus ovato-lanceolatis, inferioribus dentato-haſtatis, ſinuato-ſerratis. Conyza lobata *Linn.*
Santolina. 2. *Brown. j.* 315. Virga aurea major, ſive—*Sloan.* h. 1. 260. t. 152. f. 2. Conyza fol. lobatis haſtatis. *Plum. ic.* 96.
Jamaica. ♄.

ERIGERON.

rivulare. 8–9. E. foliis cuneatis acutis hirtis apice utrinque dentatis, margine ciliatis, caulinis ſeſſilibus; caule ſimpliciuſculo erecto paucifloro.
Jamaica, Hiſpaniola. ⊙.

TUSSILAGO.

albicans. 2–3. T. ſcapo unifloro ebracteato, flore erectiuſculo; foliis lanceolato-ovatis ſubtus tomentoſis obſolete retrorſum ſerratis.
Leontodon tomentoſum. *Linn. ſuppl.* 347.
Jamaica. ⊙.

pumila. 2–3. T. ſcapo unifloro ebracteato erecto, foliis lyratis inciſis denticulatis tomentoſis.
Jamaica. ⊙.

CINERARIA.

glabra. 8–9. C. floribus corymboſis, calycibus cylindricis; foliis oblongis acutis ſubdenticulatis enerviis, utrinque glabris ſubſucculentis; caule fruticoſo.
Jamaica. ♄.

diſcolor. 8–9. C. floribus corymboſis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſubdenticulatis glabris, ſubtus niveo-tomentoſis; caule fruticoſo.
Jamaica. ♄.

PECTIS.

humifuſa. 4. P. foliis ovatis ſubtus punctatis, baſi utrinque ciliatis, caulibus procumbentibus. *
Jacobea humifuſa Hyperici folio. *Plum. cat.* 10. *ic.* 84. t. 95. f. 2.
Guadeloupe, St. Cruz. ☉.

ECLIPTA.

ſesſilis. 4. E. ? caule erecto, foliis ſubamplexicaulibus ovatis dentatis; floribus axillaribus ſesſilibus diſcoideis.
Jamaica. ☉.

MATRICARIA.

proſtrata. M. ? foliis ſimplicibus ovatis dentatis, pedunculis lateralibus unifloris; ramis decumbentibus. *
Curaçao.

VERBESINA.

pinnatifida. 3–4. V. foliis alternis pinnatifidis.
Bidens fruteſcens, ſphondylii foliis & facie. *Plum. ſp.* 10. *ic.* 41. t. 51.
Jamaica.

POLYGAMIA NECESSARIA.

MELAMPODIUM.

humile. 3. M. caule erecto, foliis lyrato-dentatis ſesſilibus.
Jamaica, Domingo. ☉.

TRIXIS

TRIXIS. (XLIX. E.)

Receptaculum paleaceum.
Pappus nullus. *Semina* apice villoſa.
Corollulæ radii 3-fidæ.
(poſt *Melampodium.*)

therebinthinacea. 1. S. foliis ovatis ſerrulatis hiſpidis ſubtus hirſutis, floribus corymboſis.
Jamaica. ♄.

aſpera. 2. T. foliis ovatis baſi & apice attenuatis dentato-ſerratis aſperis; floribus paniculatis. *
Bailleria aſpera. *Aubl. gvian.* 804. t. 317.
India occidentalis. ♄.

eroſa. 3. T. foliis lato-ovatis inciſo-ſerratis rugoſis ſcabris, petiolis longioribus.
Dominica, Chriſtopher. ♄.

POLYGAMIA SEGREGATA.

ELEPHANTOPUS.

ſpicatus. 3. E. foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſcabris, faſciculis florum ſeſſilibus lateralibus, caule ramoſo. E. ſpicatus. *Juſſieu. Aubl. gv.* 808.
Conyza minor inodora helenii folio. *Sloan.* h. 1. 256. t. 150. 3. 4.
Jamaica, Hiſpaniola. ♃.

anguſtifolius. 4. E. foliis caulinis lineari-lanceolatis integris villoſis, floribus glomeratis, faſciculis ſeſſilibus pedunculatisque, caule ſimplici.
Conyza inodora helenii folio integro anguſto. — *Sloan.* h. 1. 256. t. 148. f. 4.
Jamaica. ♄.

TETRANTHUS.

Calyx communis quadriflorus.
Perianth. floſc. proprium monophyllum.
Semina coronata.
Polygamia æqualis.
(poſt *Echinopen.*)

littoralis. 1. TETRANTHUS.
Hiſpaniola. ☉.

ROLANDRA. Rottboell.

Floſculi faſciculati in capitulum ſquamis interjectis.
Calyx partialis bivalvis, 1-florus.
Corollulæ hermaphroditæ.
Pappus nullus.
(poſt *Echinopen.*)

argentea. 1. ROLANDRA. Rottböll. *Coll. Hafn. med.* II. 256.
Amaranthoid. fruticoſum. — *Sloan.* h. 1. 47. t. 7.
Echinops fruteſcens ad nodos floridus. *Plum. ic.* 114. t. 123.
Echinops fruticoſus. *Linn. Sp. pl. ed.* 1.
India Occidentalis, ♄.

MONOGAMIA.

BRYONIA.

racemoſa. 4–5. B. foliis cordatis trilobis, ſuperioribus ovatis ſcabriuſculis; floribus racemoſis, baccis nutantibus ovalibus. B. racemoſa. *Mill. dict.*
Bryonia racemoſa, foliis ficulneis. *Plum. fil.* 83. t. 97.
Jamaica. ♄.

SICYOS.

edulis. 1–2. S. foliis angulatis, baſi cordatis lobatis, fructu oblongo echinato. S. edulis. *Jacq. am.* 258. t. 163. Sechium. *Brown. jam.* 355.
India occidentalis. ☉.

LOBE-

LOBELIA.

acuminata. 17–18. L. caule erecto ſuffruticoſo, foliis lanceolatis attenuatis ſerrulatis; racemo terminali multifloro. Lobelia 2. *Brown. jam.* 322. Rapunculus folio oblongo. *Sloan.* h. 1. t. 95. *Jamaica.*

ſtricta. 17–18. L. caule erecto ſuffruticoſo, foliis inferioribus ovato-lanceolatis glabris, margine denticulato-aculeatis; racemo terminali ſpicato.* *India occidentalis, Guadeloupe.*

VIOLA.

ſtipularis. 21–22. V. caule ſimplici reptante, foliis ovato-lanceolatis crenatis glabris, ſtipulis ciliatis; pedunculis ſolitariis terminalibus. * *India occidentalis, St. Chriſtopher.* ♃.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

ORCHIS.

monorrhiza. 6–7. O. bulbo ſolitari indiviſo, nectarii labio 3-partito: lateralibus ſetaceis, cornu lineari compreſſo germinis longitudine.
Orchis ſetacea? *Jacq. am.* 220.
Satyrium. 1. *Brown. jam.* 324.
Jamaica, Hiſpaniola. ♃.

SATYRIUM.

hirtellum. S. bulbis filiformibus, caule hirſuto, foliis ovatis trinerviis petiolatis vaginantibus, nectario cornuto, labio trilobo.
Jamaica. ♄.

plantagineum. S. *bulbis filiformibus, caule glaberrimo, foliis ovatis petiolatis vaginantibus, nectarii cornu incraſſato, labio 2-lobo, medio acuminato.*
S. plantagineum *Linn.*

adnatum. S. bulbis faſciculatis, foliis radicalibus oblongis petiolis longiſſimis, ſcapo vaginato, nectario cornuto adnato, labio deflexo 2-lobo emarginato.
Jamaica, Hiſpaniola. ♃.

Orchioides. S. bulbis faſciculatis oblongis, foliis lato-lanceolatis, ſcapo vaginato, nectario cornuto, labio lanceolato acuminato. Satyrium 7. *Brown. jam.* 325.
Jamaica. ♃.

ſpirale. S. bulbis faſciculatis oblongis, foliis linearibus, ſcapo vaginato, floribus ſpirali-ſecundis, labio trilobo, medio majori crenulato.
Jamaica. ♃.

elatum.

elatum. S. bulbis faſciculatis craſſis tomentoſis, foliis radicalibus ovatis petiolatis, caule ſubnudo; nectario ſubtrilobo. Satyrium. 2. *Brown. jam.* 324. Helleborine foliis liliaceis, radice aſphodeli minori. *Plum. ic.* 190.
Jamaica, Hiſpaniola. ♃.

MALAXIS. Solandr. (VII.)

Nectarium monophyllum, concavum, cordatum, poſtice acuminatum antice 2-fidum; *genitalia* in medio fovens.

(pone *Ophrydem.*)

ſpicata. 1. M. ſcapo qvadrangulari, floribus ſpicatis.
Jamaica. ♃.

umbelliflora. 2. M. ſcapo quinqvangulari, floribus umbellatis.
Jamaica. ♃.

SERAPIAS.

polyſtachia. 4–5. S. bulbis fibroſis, caule ſubdiviſo geniculato, foliis oblongo-lanceolatis, racemo compoſito terminali; nectarii labio ovato recurvato.
Jamaica, Hiſpaniola. ♃.

flava. 4–5. S. bulbis fibroſis, caule ſubdiviſo geniculato, foliis oblongo-lanceolatis, racemis compoſitis axillaribus, labio nectarii erecto acuminato.
Jamaica. ♃.

LIMODORUM.

utriculatum. 3. S. radice tuberoſa, foliis radicalibus geminis vaginatis, vagina radicali inflata; ſcapo vaginato, floribus ſeſſilibus.
Jamaica, Domingo. ♃.

gentianoides. 4. L. ? radice tuberoſa; aphyllum, caule vaginato, floribus pedunculatis.
Jamaica. ♃.

CRANICHIS. (VII).

Nectarium galeatum.

(poſt *Arethuſam.*)

aphylla. 1. C. bulbis faſciculatis teretibus acutis; ſcapo ſubnudo, petalis conniventibus.
Jamaica. ♃.

oligantha. 2. C. bulbis faſciculatis clauatis, foliis petiolatis oblongis acuminatis nitidis; ſcapo ſubnudo, ſpica filiformi, petalis conniventibus.
Jamaica. ♃.

diphylla. 3. C. bulbis faſciculatis filiformibus nudis, foliis petiolatis cordatis acuminatis geminis; ſcapo ſubnudo.
Jamaica. ♃.

ſtachyodes. 4. C. bulbis faſciculatis teretibus obtuſis, foliis petiolatis ovatis acuminatis; ſcapo vaginato, ſpica tereti, petalis revolutis.
Jamaica. ♃.

muſcoſa. 5. C. bulbis filiformibus faſciculatis tomentoſis, foliis radicalibus petiolatis ovatis, caulinis vaginatis; nectario intus punctato.
Jamaica. ♃.

EPIDENDRUM.

* *Scandentia.*

claviculatum. 1–2. E. caule ſcandente tereti ramoſo, foliis ſeſſilibus ſemiamplexicaulibus acutis concavis recurvis rigidis. Cerei affinis, ſcandens planta aphylla. *Sloan.* h. 1. t. 224. 3–4.
Jamaica, Hiſpaniola. ♃.

** *Caule folioſo erecto.*

ramoſum. E. caule ramoſiſſimo ſuffruteſcente, foliis linearibus emarginatis, racemis terminalibus compreſſis.
E. ramoſum. *Jacq. am.* 221. t. 132.
Jamaica.

nutans

nutans. E. caule ſimplici, foliis ovato-lanceolatis enerviis amplexicaulibus, ſpica terminali nutante; labio nectarii trilobo, intermedio tridentato.
Jamaica.

umbellatum. E. caule ſimplici, foliis ovatis emarginatis amplexicaulibus aveniis; floribus terminalibus umbellatis. E. difforme? *Jacq. am.* t. 136.
Jamaica.

anceps. E. foliis cordato-lanceolatis amplexicaulibus horizontalibus, racemo terminali compreſſo ancipiti ſubflexuoſo, floribus diſtichis, petalis interioribus capillaribus, labio trilobo.
Jamaica.

rigidum. E. foliis oblongis obtuſis vaginantibus, racemo terminali compreſſo ancipiti, floribus diſtichis ſpathis majoribus; labio integro cordato-ovato acuto. E. rigidum. *Jacq. am.* 222. t. 134.
Jamaica.

diffuſum. E. foliis oblongis amplexicaulibus, caule ancipiti, panicula terminali ramoſiſſima diffuſa; labio integro acuminato.
Jamaica.

montanum. E. foliis lanceolatis planis recurvis patentibus ſubmembranaceis, racemo terminali ſimplici, floribus ſecundis; labio trifido.
Jamaica. ♃.

ſerrulatum. E. caulibus aggregatis ſubdiphyllis, foliis lanceolatis carinatis ſerrulatis, racemo terminali, floribus diſtichis.
Jamaica.. ♃.

teretifolium. E. foliis ſemiteretibus, caule unifloro, labio apice triquetro.
Jamaica.

globoſum. E. foliis teretibus canaliculatis, floribus terminalibus ſubſolitariis, labio ovato acuto; capſulis globoſis. E. globoſum. *Jacq. am.* 221. t. 133. f. 1.
Jamaica. ♃.

*** *Caule repente.*

ſertularioides. E. caule filiformi repente articulato, foliis lanceolatis, pedunculis unifloris e vaginis radicalibus.
Jamaica. ♃.

teſtæfolium. E. caule repente, foliis incumbentibus ellipticis convexo-concavis carinatis, floribus ſub foliis ſeſſilibus.
Jamaica. ♃.

**** *Acaulia, foliis radicalibus.*

undulatum. E. foliis ellipticis acutis, ſcapo ſarmentoſo ramoſiſſimo, petalis ovatis ungviculatis obtuſis, labio dilatato emarginato undulato. Satyrium. 15. *Brown. j.* 326.
E. chartaginenſe? *Jacq. am.* 228. t. 133. 4. Viſcum radice majus & elatius delphinii flore ferrugineo et guttato. *Sloan.* h. I. 250. t. 148. f. I. Helleborine maculoſa, foliis aloës carinatis. *Plum. ic.* 178. f. 2.
Jamaica.

variegatum. E. foliis lanceolatis carinatis canaliculatis, margine cartilagineo-ſerratis, vaginis imbricatis, ſcapis vaginalibus racemo ſimplici; labio cruciato bilobo. E. tetrapetalum? *Jacq. am.* t. 132.
Helleborine foliis carnoſis carinatis__? *Plum. ic.* 177. t. 182. 2.
Hiſpaniola. ♃.

Utricularioides. E. foliis lanceolatis lineatis planis, ſcapo paniculato, labio magno cordato, cornu breviſſimo.
Jamaica, Hiſpaniola. ♃.

triquetrum. E. foliis triquetris cultratis apice compreſſis lanceolatis acutis, ſcapo ſimplici; labio cordato ovato, lateribus emarginatis.
Jamaica. ♃.

ſeſſile. E. foliis baſi compreſſis ſuperne latioribus, lanceolato-linearibus obtuſis aveniis, pedunculis radicalibus breviſſimis unifloris.
Jamaica. ♃.

flabel-

flabelliforme. E. foliis baſi compreſſis ſuperne dilatatis, ovato-lanceolatis acutis planis nervoſis, pedunculis unifloris elongatis.
Jamaica, ♃.

ſubulatum. E. foliis ſubulatis ſulcatis, pedunculis vaginatis radicalibus multifloris.
Jamaica. ♃.

Satyrioides. E. foliis ſubulato-teretibus, ſcapo paucifloro, corollis antice baſi ventricoſis.
Hiſpaniola. ♃.

tribuloides. E. foliis pedicellatis lanceolatis obtuſis emarginatis, pedunculis breviſſimis, capſulis globoſis echinatis.
Jamaica. ♃.

corniculatum. E. foliis pedicellatis cuneatis oblongis, pedunculis radicalibus unifloris, corollis acuminatis curvis.
Jamaica. ♃.

lanceola. E. foliis pedicellatis lanceolatis acutis, pedunculis ex vaginis radicalibus bifloris.
Jamaica. ♃.

***** *Foliis bulbis innatis.*

anguſtifolium. E. folio lineari bulbo innato, ſcapo paniculato.
Jamaica. ♃.

palmifolium. E. foliis lato-lanceolatis nervoſis membranaceis bulbo innatis, pedunculis radicalibus vaginatis multifloris, nectario cymbiformi integro reflexo.
Jamaica. ♃.

altiſſimum. E. foliis lanceolatis bulbis innatis, ſcapo ramoſiſſimo ſarmentoſo, petalis oblongo-lanceolatis acutis, labio obcordato, petalis breviore. * E. altiſſimum *Jacq. am.* 229. t. 141.
Jamaica. ♃.

fragrans. E. folio lato-lanceolato enervi bulbo innato, ſcapo multifloro abbreviato, labio cordato.
Jamaica. ♃.

ſan-

ſanguineum. E. foliis geminis oblongis bulbo innatis, ſcapo multifloro ſubflexuoſo, labio ſubrotundo undulato emarginato, cornu adnato. Satyrium 3. *Brown. jam.* 325. piſcum radice bulboſa major. — *Sloan.* h. 1. p. 250. t. 121. f. 2.
Jamaica. ♃.

labiatum. E. foliis radicalibus oblongis, bulbo medio ſolitari monophyllo, ſcapis paucifloris, labio oblongo corpuſculo carnoſo ſuperne adnato.
Hiſpaniola. ♃.

polybulbon. E. caule repente bulbifero, bulbis diphyllis unifloris, flore pedunculato, labio cordato.
Jamaica. ♃.

proliferum. E. cauleſcens, foliis diſtichis ſubimbricatis ovatis; bulbis e vaginis foliorum diphyllis, floribus axillaribus ſeſſilibus.
Jamaica. ♃.

veſtitum. E. caule aphyllo, vaginis undique imbricato tereti uſculo bulbifero, bulbis folio innato; floribus confertis e vaginis caulinis.
Jamaica. ♃.

vomiforme. E. cauleſcens, foliis bulbis innatis ovato-acuminatis convexis canaliculatis, ſubtus triquetris; ſcapis e ſinu foliorum.
Jamaica.

****** *Caules repentes, foliis imbricatis.*

echinocarpon. E. caule compreſſo decumbente unifloro, foliis undique imbricatis diſtichis ovatis; capſulis muricatis. Limodorum pendulum. *Aubl. guian.*
Jamaica. ♃.

trichocarpon. E. caule compreſſo tereti radicante, foliis undique imbricatis diſtichis linearibus; capſulis tomentoſis.
Jamaica. ♃.

glaucum. E. caule compreſſo erectiuſculo multifloro, foliis undique imbricatis diſtichis lato-lanceolatis glaberrimis ſubtus glaucis; capſulis nudis.
Jamaica. ♃.

gra.

graminoides. E. caule erecto compreſſo multifloro, foliis undique imbricatis diſtichis remotis linearibus, pedunculis longioribus.
Jamaica. ♃.

******* *Caules unifoliati.*

micranthum. E. caule unifolio, folio lato-lanceolato, racemo longiſſimo filiformi, floribus ſecundis ſubrotundis hexagonis.
Jamaica. ♃.

trigoniflorum. E. caule unifolio, folio oblongo lanceolato, racemo longitudine foliorum, floribus ſubſecundis trigonis. E. ophiogloſſoides. *Jacq. am.* t. 133. f. 3.
Jamaica. ♃.

racemiflorum. E. caule unifolio, folio ovato, racemo foliis longiore, floribus ſecundis, petalis interioribus ovatis.
Jamaica. ♃.

alpeſtre. E. caule unifolio, folio ovato-lanceolato, racemis laxis, capſularum carinis muricatis.
Hiſpaniola. ♃.

laxum. E. caule unifolio, folio oblongo, racemo longitudine foliorum, interioribus petalis ſubulatis, labio ovato, capſulis nudis.
Jamaica. ♃.

ovale. E. caule unifolio, folio ovato acuminato, racemo adpreſſo multifloro, petalis ſubrotundis, interioribus antice baſi remotis, capſulis pedicellatis.
Jamaica. ♃.

pulchellum. E. caule unifolio, folio ſubrotundo-acuto, racemo laxo paucifloro, petalis acuminatis ciliatis, interioribus apice cruciantibus.
Jamaica. ♃.

tridentatum. E. caule unifolio, folio ovato-acuto apice tridentato, racemo multifloro, floribus triquetris acuminatis, petalis nectarii erectis incurvis.
Jamaica. ♃.

cochle-

cochlearifolium. E. caule unifolio, folio orbiculato convexo concavo, racemo paucifloro.
Jamaica.

******** *Aphylla.*

funale. E. aphyllum, filiforme radicans: pedunculo 2-floro, labio 2-lobo, cornu longiſſimo ſubulato.
Jamaica. ♃.

filiforme. E. aphyllum, filiforme, radicans; pedunculis ſub 3-floris, labio ovato, cornu breviſſimo, apice capitato.
Hiſpaniola. ♃.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

obtuſata. 9–10. A. foliis cordatis apice rotundatis 3-nerviis, ſubtus reticulato-venoſis tomentoſis; caule volubili, pedunculis ſolitariis. *
Ariſtolochia. fol. cordatis obtuſis. *Plum. ic.* 27. t. 33.
Inſulæ Caribeæ. ♃.

grandiflora. 9–10. A. foliis lato-cordatis, caule volubili ſubherbaceo, pedunculis ſolitariis: labio corollæ maximo, cauda longiſſima.
Brown. jam. 329. n. 4.
Jamaica. ♃.

CLAS-

CLASSIS XXI.

CRYPTOGAMIA.

PLANTÆ.

FICUS.

america-na. 10–11. F. foliis ovatis oblongis venoſis integerrimis baccis axillaribus pedunculatis confertis.
Ficus americana *Aubl.*
Ficus alia, foliis lauri fructu minore. *Plum. ſp.* 124. t. 132. f. 2.
Ficus indica folio oblongo fructu minore pallide luteo ſphærico. *Sloan.* h. 2. p. 140.
Jamaica. ♄.

FILICES.

OSMUNDA.

peltata. 11–12. O. ſurculo repente, fructificationibus pedatis diſtinctis ſubrotundo-dimidiatis integris; frondibus dichotomis laciniis linearibus.
Lichen digitatus Geranii facie. *Plum. fil.* T. 50. f. 4.
Jamaica.

aurita. 11–12. O. ſcapis radicatis; frondibus inferne bipinnatis ſuperne pinnatis, pinnis baſi ſurſum auritis ſerratis convexis nitidis.
Jamaica.

lineata. 17–18. O. frondibus pinnatis lanceolatis, baſi oblique cordatis margine integris; fructificantibus (pinnis) crenulatis medio ſqvamoſis.
Jamaica.

polypodi-oides. 17–18. O. frondibus lanceolatis pinnatifidis, laciniis confluentibus integris adſcendentibus, punctis ad marginem elevatis, ſcapo lanceolato, pinnis remotis.
Jamaica.

MARA-

MARATTIA.

Capſulæ multiloculares: *Loculis* ſuperne dehiſcentibus.
(pone *Oſmundam.*)

alata. 1. MARATTIA.

ACROSTICHUM.

ſimplex. 1–2. A. frondibus integris glabris petiolatis, ſterilibus lanceolatis acuminatis, fertilibus lineari-lanceolatis.
Jamaica.

petiolatum. 1–2. A. frondibus integris glabris petiolatis, ſterilibus lineari-lanceolatis, fertilibus linearibus.
Jamaica.

latifolium. 1–2. A. frondibus petiolatis lato-lanceolatis glaberrimis integris marginatis; fructiferis ovato-lanceolatis, ſurculo repente. Acroſticum 1. *Brown. jam.* 104. Lingva cervina rigida & glabra. *Plum. fil.* 135.
Jamaica.

villoſum. 4–5. A. frondibus lato-lanceolatis ſubcrenulatis utrinque villoſis. Lingva cervina villoſa minor. *Plum. fil.* 127. f. D.
Jamaica.

muſcoſum. 4–5. A. frondibus petiolatis integris ſqvamoſis; ſterilibus oblongo-lanceolatis obtuſis, fertilibus lineari-lanceolatis.
Lingva cervina villis & ſqvamulis aureis muſcoſa. *Plum. fil.* 139.
Jamaica.

ſerrulatum. 5–6. A. frondibus linearibus dentatis, apice fructificantibus, ſurculo brevisſimo radicante.
Jamaica.

graminoides. 6–7. A. frondibus nudis linearibus apice ſubdichotomis fructificantibus.
Jamaica.

ſul-

ſulphureum. 27-28. A. frondibus bipinnatis; pinnis alternis ovatis pinnatifidis, foliolis retuſis ſerratis. Filix aurea pinnulis rotundis inciſis, diviſa. *Plum. fil.* 44.
Jamaica.

PTERIS.

anguſtifolia. 2-3. P. frondibus ſimplicibus lanceolato-linearibus integris erectis margine toto fructificanibus.
India occidentalis.

denticulata. 10-11. P. frondibus pinnatis, pinnis inferioribus ſemipinnatis lanceolatis, ſterilibus denticulato-ciliatis, fertilibus integerrimis.
Hiſpaniola.

aculeata. 16-17. P. fronde ſupradecompoſita, foliis 2-pinnatifidis, pinnis lato-lanceolatis, caudice arboreo aculeato. Filix ramoſa arboreſcns et aculeata. *Plum. fil.* t. 5.
Jamaica.

HEMIONITIS.

lineata. 1-2. H. fronde lanceolato-lineari, lineis fructificantibus ſubparalellis longitudinalibus.
Jamaica.

ASPLENIUM.

proliferum. 1-2. A. frondibus ſubſeſſilibus lato-lanceolatis primoribus obovatis, apice radicantibus. Phyllitis non ſinuata apice folii radices agente. *Sloan.* h. I. 71. t. 26. f. 1.
Jamaica.

pumilum. 7-8. A. fronde ternata, foliolis 3-partito-inciſis. Hemonitis pumila 5-phylla? *Plum. fil.* 66. A.
Jamaica.

dimidiatum. 11-12. A. frondibus pinnatis, pinnis trapezo-oblongis acuminatis ſurſum angulatis deorſum integris planis.]
Jamaica.

fragrans. 20-21. A. frondibus ſub-3-pinnatis, foliolis alternis, pinnis lanceolatis latiuſculis, apice ſerratis. *Jamaica.*

grandifolium. 22-23. A. frondibus pinnatis; pinnis alternis lanceolatis ſubſerratis, baſi ſuperne rectangulofis, inferne rotundatis. *Jamaica.*

diſſectum. 22-23. A. frondibus pinnatis, pinnis lanceolatis inciſo-ſerratis apice caudatis. Lonchitis dentata pinnularum cacumine diſſecto. *Plum. fil.* 46. *Jamaica.*

præmorſum. 22-23. A. fronde 3-pinnatifida, pinnis ſubcuneiformibus, pinnulis apice eroſo-dentatis. *Jamaica.*

cicutarium. 22-24. A. fronde 3-pinnata glaberrima, ſuperioribus pinnatifidis, foliolis lanceolatis integris. Rutæ murariæ accedens, filicula non ramoſa minima. *Sloan.* h. 1. 92. t. 52. f. 3. mala.

POLYPODIUM.

* *Fronde indiviſa.*

anguſtifolium. 1-2. P. frondibus lineari-lanceolatis longisſimis acuminatis rigidis, margine convexo, fructificationibus ſparſis, ſurculo repente. *Jamaica.*

gramineum. 1-2. P. frondibus acuminatis integerrimis glabris, fructificationibus ſolitarii, ſurculo nudo. *Jamaica.*

marginellum. 1-2. P. frondibus cuneiformibus linearibus obtuſis marginatis glabris, fructificationibus ſolitariis confertis, ſurculo brevisſimo nudo. *Jamaica.*

repens. 1-2. P. frondibus lanceolatis acuminatis glabris integris, fructificationibus ſparſis; ſurculo repente. Lingva Cervina radice repente. *Plum. fil.* t. 134. *Jamaica.*

ſer-

ſerpens. 2-3. P. frondibus lanceolato-linearibus glabris ſubundulatis, fructificationibus ſolitariis; ſurculo hirſuto radicante.
Lingva cervina ſcandens anguſtis & undoſis foliis. *Plum. fil.* t. 124.
Hiſpaniola.

** *Fronde pinnatifida.*

pendulum. 11-12. P. frondibus pinnatifidis ſubſeſſilibus glabris pendulis, lobis oblongis obtuſiuſculis.
Jamaica.

inciſum. 13-14. P. frondibus lanceolatis pinnatifidis, lobis rotundatis, infimis minoribus coadunatis.
Polypodium inciſuris aſplenii. *Plum. fil.* t. 91.
Polypodium ſcolopendrioides. *Linn. Sp. pl. ed.* 1.
Jamaica.

trichomanoides. 13-14. P. frondibus pinnatifidis ſubpiloſis, lobis ſemiovatis obtuſis.
Jamaica.

myoſuroides. 13-14. P. frondibus pinnatifidis glabris, lobis in apicem lanceolatum coadunatis fructiferis; inferioribus remotis.
Jamaica.

incannum. 19-20. P. frondibus pinnatifidis, pinnis lanceolatis obtuſis diſtantibus patentibus integris, ſubtus ſtipiteque incano-ſqvamuloſis.
Acroſtichum polypodioides. *Linn. Sp. pl.*
Acroſtichum 2. *Brown. jam.* 105.

*** *Fronde pinnata.*

muricatum. 27-28. P. frondibus pinnatis, pinnis falcato-lanceolatis ſubſerratis ſurſum auritis, baſi & antice ſpinoſis, ſtipite ſqvamoſo.
Trichomanes majus totum album pinnis aculeatis trapezii figura. *Sloan. h.* 82. t. 36. f. 4-5.
Jamaica.

ſemicordatum. 28–29. P. fronde pinnata, pinnis paralellis lanceolatis glaberrimis, baſi oblique cordatis, lobo inferiore gibboſiore, fructificationibus 4-ſeriatis. Lingva Cervina fol. enſiformibus ſerratis. *Plum. fil.* t. 113.
Jamaica.

ſagittatum. 28–29. P. fronde pinnata, pinnis lanceolatis obtuſis integris, baſi utrinque denticulo auctis inferioribus mutilatis 3-angularibus minutis.
Jamaicâ.

repens. 32–33. P. frondibus pinnatis repentibus, apice radicantibus, pinnis ſubcordatis ovatis obtuſis crenatis, baſi ſubauriculatis. Lonchitis aſplenii facie. *Sloan.* h. t. 30. f. 1. Adianthum. *Pluk. alm.* t. 253. f. 4.
Jamaica.

rhizophyllum. 32–33. P. frondibus pinnatis decumbentibus, apice caudatis fructiferis radicantibus, pinnis ovato-deltoideis.
Jamaica.

obliteratum. 35–36. P. fronde pinnata, pinnis alternis lato-lanceolatis attenuatis crenatis, crenis apice & baſi utrinque obliteratis.
Jamaica.

crenatum. 35-36. P. fronde pinnata, pinnis oblongo-lanceolatis crenatis glabris, fructificationibus dupliciter ſerialibus. Lingva Cervina rotundius crenata. *Plum. fil. t.* III. *am.* 10.
Jamaica.

**** *Fronde bipinnatifida.*

ſerra. 38–39. P. fronde bipinnatifidâ, pinnis linearibus longiſſimis attenuatis ſerratis, ſerraturis ſemiovatis acutis ſtriatis.
Filix non ramoſa major, ſurculis — *Sloan.* h. 1. 90. t. 48. ?
Jamaica.

4-gonum. 38–39. P. frondibus 2-pinnatifidis; pinnis lanceolatis acuminatis oppoſitis diſtantibus horizontalibus, laciniis ovatis obtuſiuſculis, ſtipite tetragono.
Jamaica.

ſanctum

ſanctum. 38–39. P. frondibus ſubbipinnatis, pinnis ſuperioribus coadunatis, inferioribus linearibus obtuſis integris, infimis majuſculis acutis crenatis. Acroſtichum ſanctum *Linn.* Acroſtichum. *Brown. jam.* 105.
Filix jamaicenſis *Pluk. alm.* 150. t. 283. *Sloan.* h. t. 49. 2.
Jamaica.

deltoideum. 39–40. P. fronde 2-pinnatifida, pinnis inferioribus abbreviatis integris oblongis deltoidibus reflexis.
Jamaica.

inviſum. 45–46. P. fronde 2-pinnatifida glabra; pinnis lineari-lanceolatis attenuatis longiſſimis, pinnulis ovato-falcatis acutis integris, infimis æqvalibus. Filix non ramoſa major, ſurculis crebris pinnulis longis anguſtis. *Sloan.* h. 1. 90. t. 51.
Jamaica, Hiſpaniola.

patens. 45–46. P. fronde 2-pinnatifida, ſubtus villoſiuſcula; pinnis lineari-lanceolatis elongatis; pinnulis oblongis acutis integris, infimis longioribus. Filix non ramoſa minor *Sloan.* h. 1. 91. t. 52. f. 1.
Jamaica.

hirtum. 53–54. P. fronde inferne 3-pinnatifida, ſuperne 2-pinnatifida & tandem pinnatifida, laciniis ovatis obtuſis ſubintegris, ſtipite ramisque hirtis.
Jamaica.

dichotomum. 61–62. P. dichotomum, frondibus pinnatis, pinnis lineari-lanceolatis integerrimis horizontalibus, ſubtus glaucis. Acroſtichum furcatum. *Linn.*
Polypodium dichotomum. *Thunb. Japon.* 338. t. 37. *Plum. fil.* 1. 28.

coriaceum. 66–67. P. fronde coriacea, inferne 3-pinnatifida, ſuperne 2-pinnata, pinnis pinnulisque acuminatis.
Jamaica.

denticulatum. 77–78. P. fronde inferne 4-pinnata, ſuperne 3-pinnata glabra; pinnulis cuneato-ovatis inciſis denticulatis fructificationibus ſolitariis. *Jamaica.*

armatum. 59–60. P. frondibus 4-pinnatis, pinnulis lanceolatis crenulatis ſupra glabris, inferne hirſutis, fructificationibus confertis; ramis ramulisque aſperis, caudice arboreo aculeato. *Jamaica.*

glaucum. 64–65. P. frondibus 4-pinnatis, ramis ramulisque lanceolatis; pinnis lanceolatis pinnatifidis, laciniis ovatis acutis, ſubtus glaucis. *Jamaica.*

diſſectum. 77–78. P. fronde 4-pinnatifida glabriuſcula, pinnulis ovatis obtuſis inciſo-ſerratis, fructificationibus in ſino ſolitariis, ramis ramulisque pubeſcentibus. Lonchitis altisſima globuligera minor. *Plum. fil.* t. 31. Adianthum nigrum ramoſum max. *Sloan.* h. 1. 96. t. 37. f. 1. 2. *Jamaica.*

effuſum. 77–78. P. fronde 5-pinnatifida ſubglabra membranacea, pinnulis acutis argute ſerratis, rachibus ramulorum marginatis. Adianthum ramoſum max. — *Sloan.* h. 1. t. 57. f. 3. *Jamaica.*

ADIANTUM.

* *Fronde compoſita.*

pumilum. 7–8. A. fronde pinnata, ſtipite capillari, pinnis alternis ſubrotundis ſerrulatis, ſumma majuſcula trapezoidea, fructificationibus interruptis. Adianthum. 1. *Brown. jam.* 87. Filix parva: *Pluk. alm.* t. 251. 4. *Jamaica.*

deltoideum. 6–7. A. fronde pinnata, pinnis alternis deltoidibus obtuſis, ſumma triangulari, fructificationibus ſuperne & antice continuatis. *Jamaica.*

macro-

macrophyllum. 6–7. A. fronde pinnata, pinnis oppoſitis rhomboideis acutis, ima majori, infimis ſubhaſtatis reflexis, fructificationibus antice & inferne continuatis. Adianthum 2. *Brown. jam.* 87. f. 38. f. 1. Trichomanes majus nigrum — *Sloan.* t. 81. 34.
Jamaica.

ſerrulatum. 15–16. A. fronde 2–pinnata, pinnulis deltoideo-oblongis ſerratis, fructificationibus ſolitariis ſuperioribus. A. ſerrulatum *Linn. Pluk. alm.* t. 253. f. 1.
Jamaica.

ſtriatum. 16–17. A. fronde 2–pinnata, pinnulis rigidis falcato-ovatis ſtriatis, fructificationibus ſuperioribus interruptis, ſtipite tereti aſpero.
Jamaica.

ſtrictum. 16–17. A. fronde 2–pinnata, pinnis tetragonis faſtigiatis erectis, pinnulis alternis lunatis integris, fructificationibus ſuperioribus continuatis.
Jamaica.

microphyllum. 15–17. A. fronde 2–pinnata: foliolis alternis oblongis obtuſis crenatis infimis pinnatifidis: Adianthum nigrum ramoſum, ramulis — *Sloan.* h. 1. 98. t. 13. f. 2.
Jamaica.

denticulatum. 21. A. frondibus decompoſitis: pinnis alternis trapezoideis acuminatis cretatis, crenis denticulatis, fructificationibus ſuperioribus interruptis. Lonchitis ſerrata & retuſa. *Plum. fil.* t. 52. Adianthum Jamaicenſe. *Pluk. phyt.* t. 252. 5.
Jamaica.

fragile. 21–22. A. fronde ſubſupradecompoſita ſuperne 2-pinnata; pinnis obovatis cuneatis integris, fructific. interruptis.
Jamaica.

tenerum. 21–22. A. fronde ſupradecompoſita: pinnulis alternis rhombeo-cuneiformibus obtuſatis inciſis, fructificationibus interruptis. Adianthum. 7. *Brown. jam.* 88. Adianthum ramoſius, pediculis lucidis. *Pluk. phyt.* t. 254. f. 1.
Jamaica, Hiſpaniola.

TRICHOMANES.

puſillum. 1–2. T. fronde ſimplici lineari inciſa, ſurculo repente.
Jamaica.

reptans. 2–3. T. frondibus cuneato-ovatis inciſo-pinnatifidis, ſurculo repente.
Jamaica.

aſplenioides. 2–3. T. frondibus pendulis lanceolatis pinnatifidis glaberrimis, laciniis bilobis, lobis obtuſis, fructificationibus bivalvibus.
Jamaica.

crinitum. 3–4. T. frondibus ſubpinnatis piloſis, pinnis ovatis pinnatifidis, laciniis bifidis, lacinulis obtuſis, fructificationibus ſetigeris ſtipite erecto hirto.
Jamaica.

lucens. 3–4. T. frondibus 2-pinnatifidis pendulis lanceolatis hirſutis lucidis, pinnis paralellis, laciniis ſubrotundis ſubſerrulatis, ſtipite hirſutisſimo.
Jamaica.

ſericeum. 4–5. T. frondibus 2-pinnatifidis pendulis lanceolatis tomentoſis, pinnis alternis, laciniis linearibus obtuſis integris, inferioribus 2-fidis, fructificationibus terminalibus hirſutis. Trichomanes pendulum ſericii inſtar molle, *Plum. fil.* t. 73.
Jamaica.

fucoides. 7–8. T. frondibus 2-pinnatifidis ovatis glabris, pinnis ovatis, laciniis bipartitis, lacinulis ſerratis obtuſis, fructificationibus 2-valvibus, ſupra baſin pinnarum inſertis.
Jamaica.

ciliatum. 7–8. T. frondibus erectis 2-pinnatifidis deltoideis; pinnis ovatis, laciniis linearibus obtuſis ciliatis, fructificationibus terminalibus bivalvibus hirtis, ſtipite marginato.
Jamaica.

lineare.

lineare. 7–8. T. frondibus ſubbipinnatis pendulis lanceolatis glabris, foliolis remotis, pinnulis linearibus 2-partitis, fructificationibus terminalibus 2-valvibus, ſtipite capillari.
Jamaica.

undulatum. 8–9. T. frondibus 3-pinnatifidis 2-pinnatisve pendulis lanceolatis, foliolis pinnisque alternis decurrentibus; laciniis linearibus retuſis crenulato-undulatis, fructificationibus terminalibus 2-valvibus.
Jamaica.

rigidum. 10–11. T. frondibus 4-pinnatifidis erectis deltoidibus, foliolis patentibus, pinnis lanceolatis, laciniis linearibus apice inciſis, ſchyphis fructiferis pedicellatis axillaribus.
Jamaica.

polyanthos. 10–11. T. frondibus 4-pinnatifidis deltoideis erectis, pinnis pinnulisque decurrentibus, laciniis linearibus obtuſis, fructificationibus bivalvibus numeroſis, ſtipite marginato.
Jamaica.

clavatum. 10–11. T. frondibus 4-pinnatifidis oblongo-lanceolatis laxis, pinnis pinnulisque decurrentibus, laciniis linearibus emarginatis, fructificationibus terminalibus 2-valvibus ſubrotundis, ſtipite teretiuſculo.
Jamaica.

aculeatum. 13. T. fronde ſupradecompoſita ſcandente ramoſiſſima, foliolis palmatis, laciniis linearibus obtuſis, ſtipite aculeato.
Acroſtichum aculeatum *Linn.*

MUSCI.

LYCOPODIUM.

ſqvarroſum. 3–4. L. foliis ſubverticillatis undique reflexis, inferioribus ſqvarroſis rigidis, caule dichotomo faſtigiato, capſulis ſparſis.
Selago Coridis folio *Dill. muſc.* 440. t. 57. f. 4.
Muſcus ſqvamoſus maximus erectus ſabinæ folio — *Plum. fil.* 144. t. 166. f. A.
Jamaica, Guadeloupe.

taxifolium. 8–9. L. foliis ſparſis lanceolato-linearibus patulis; caule erecto dichotomo, fructificationibus ſparſis.
Jamaica.

dichotomum. 8–9. L. foliis ſparſis lineari-acuminatis patulis; caule declinato asſurgente dichotomo, ramis patulis, fructificationibus ſparſis.
Brown. jam. 84. 1.
Lycopodium dichotomum. *Jacq. Vindeb.* III. 26. t. 45.
Jamaica, Hiſpaniola, Martinica.

ſtoloniferum. 23–24. L. foliis bifariis patentibus, ſuperficialibus oblongis acutis diſtichis, ſurculis tetragonis repentibus longisſimis, inferne ſubnudis ſtoloniferis; ſpicis terminalibus ſesſilibus. Muſcus ſqvamoſus repens — *Plum. fil.* t. 43.
Hiſpaniola.

FONTINALIS.

criſpa. F. ſurculis ramoſis pennatis, foliis duplicato-bifariis rotundatis patentibus imbricatis undulatis, capſulis lateralibus poſticis.
Sphagnum pennatum undulatum, vagina ſqvamoſa. *Dill. muſc.* 209. t. XXXII. f. 8.
Jamaica.

diſticha. F. ſurculis ſimplicibus, foliis bifariis patentibus retuſis imbricatis planis, capſulis lateralibus poſticis.
Jamaica, Hiſpaniola.

filicina. F. ſurculis erectis pinnatis, pinnis approximatis, foliis 5-fariis ovatis acutis; capſulis axillaribus.
Jamaica.

hypnoidea. F. ſurculis repentibus, ramis erectis ſubdiviſis ſparſis, foliis lanceolatis bicarinatis adpresſis, capſulis axillaribus.
Jamaica.

filiformis. F. ſurculis pendulis filiformibus ſimpliciuſculis divaricatis, foliis ovatis acutis denſis patulis, capſulis axillaribus ſparſis.
Hiſpaniola.

POLY-

POLYTRICHUM.

convolutum.	P.	caule ſimplici, foliis involutis ſubulatis. *Meth. Muſc.* 33. t. I. f. 3. *Jamaica.*

MNIUM.

tomentoſum.	2–3. M.	ſurculo dichotomo erecto tomentoſo, foliis ſubulatis, capſulis ſphæricis. *Jamaica.*
ſphæricarpon.	2–3. M.	ſurculis erectis tomentoſis filiformibus, ramis ſimplicibus faſciculatisque terminalibus, foliis capillaceis, capſulis ſphæricis. *Jamaica.*
ſtrictum.	7–8. M.	ſurculis cauleſcentibus, foliis capillaceis; pedunculis elongatis terminalibus, capſulis obliquis. *Jamaica.*

BRYUM.

agrarium.	6–7. B.	acaule, capſulis cylindricis erectiuſculis ſubulatis, foliis lanceolatis acutis. *Jamaica.*
acuminatum.	6–7. B.	capſulis cylindricis erectis ſubulatis, ſurculis caulescentibus cæſpitoſis, foliis linearibus. *Jamaica.*
Lycopodioides.	9–10. B.	capſulis erectis, pedunculis abbreviatis ſolitariis, ſurculis elongatis ſubramoſis, foliis patentibus linearibus acutis ſerrulatis ſubundulatis. *Jamaica.*
paraſiticum.	12–13. B.	capſulis erectiuſculis, pedunculis breviſſimis, ſurculis confertis ramoſis brevibus, foliis patentibus linearibus. *Hiſpaniola.*
calycinum.	13–14. B.	capſulis erectiuſculis, perichætiis longiſſimis longitudine pedunculorum; ſurculis erectis, foliis linearibus cirrhoſis. *Jamaica.*

HYP-

HYPNUM.

palmatum.	4–5.	H.	fronde ſimplicisſima pinnata ſubpalmata, apice pedunculifera, pinnis diſtantibus patentibus. *Jamaica.*
polypodioides.	4–5.	H.	fronde ſimplicisſima pinnata lanceolata erecta, verſus apicem pedunculifera, pinnis obtuſis, pedunculis capſulisque incurvis. *Jamaica.*
aſplenioides.	6–7.	H.	fronde ſubramoſa pinnata erecta lineari, apice pedunculifera, capſulis incurvis. *Jamaica.*
fulgens.	10–11.	H.	ſurculis vagis longisſimis pendulis; frondibus compresſis foliolis diſtichis complicato-carinatis nitidis. *Jamaica.*
diaphanum.	10–11.	H.	ſurculis vagis erectiuſculis ſubdiviſis, foliolis bifariis ovatis acuminatis pellucidis planis. *Jamaica.*
albicans.	12–13.	H.	ſurculis repentibus ramoſis compresſis, ramis vagis, foliolis bifariis ovatis acutis pallidis, capſulis ſubnutantibus. *Jamaica.*
glabellum.	13–14.	H.	ſurculis divaricatis erectiuſculis ramoſis, foliolis bifariis imbricatis oblongis obtuſis planis ſubdenticulatis. *Jamaica.*
patulum.	29-30.	H.	ſurculis filiformibus repentibus, ramulis vagis brevisſimis, foliolis lanceolatis reflexo-patulis. *Jamaica.*
reptans.	31–32.	H.	ſurculis reptantibus, ramis vagis faſciculatisve radicantibus filiformibus, foliolis capillaribus patulis, capſulis nutantibus. *Jamaica.*
faſciculatum.	32–33.	H.	ſurculo erecto, ramis terminalibus confertis ſubdiviſis, ramulis compresſis, foliolis oblongis decusſatis ſparſis. *Jamaica.*

ta-

tamariſci. 32–33. H. ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſubdiviſis, foliis bifariis, ſubtus medio auriculatis, foliolis ſubrotundis acutis carinatis.
Jamaica.

flexile. 34–35. H. ſurculis repentibus pendulisque longiſſimis flexuoſis, ramulis vagis abbreviatis teretibus recurvis, foliolis confertis ovatis patulis.
Jamaica.

nigreſcens. 34–35. H. ſurculis filiformibus pendulis, ramis brevibus teretibus ſparſis, foliis æqvalibus ſubulatis patulis.
Jamaica.

denſum. 34–35. H. ſurculis erectis teretibus, ramis vagis ſimpliciuſculis, foliolis approximatis lanceolatis acutis carinatis patulis.
Jamaica.

compoſitum. 35–36. H. ſurculis ramisque pinnato-ſparſis, ramulis confertis, pedunculis breviſſimis, capſulis erectis, calyptris piloſis.
Jamaica.

polytrichoides. 38–39. H. ſurculis teretibus erectis ſimplicibus, foliis patulis, pedunculis brevibus, capſula erecta calyptra piloſa.
Jamaica.

capillare. 40–41. H. ſurculis repentibus filiformibus ramoſis, ramis confertis capillaribus, foliolis adpreſſis ſubulatis, capſulis ovatis erectis.
Jamaica.

tomentoſum. 40–41. H. ſurculis repentibus tomentoſis, ramis vagis confertis erectiuſculis, foliolis acutis patentibus diſtantibus, capſulis cylindricis nutantibus, operculis incurvis.
Hiſpaniola.

depreſſum. 41–42. H. ſurculis confertis repentibus ramoſis, ramulis depreſſis, foliolis lineari-lanceolatis patulis ſiccitate criſpis, capſulis nutantibus.
Jamaica.

trichophyllum. 41–42. H. ſurculo repente, ramis diſtantibus erectis foliis capillaribus patentibus, capſulis erectis. Muſcus. Sloan. h. 1. t. 25. f. 1.
Jamaica.

micro-

microphyl-lum. 42–43. H. ſurculis confertis repentibus ramoſis, ramulis filiformibus teretibus erectis, foliolis incumbentibus ſubulatis; capſulis obliqvis.
Jamaica.

cæſpitoſum. 43–44. H. ſurculis confertis ſimplicibus erectiuſculis tereti-compreſſis, foliol. ovato-lanceolatis, pedunculis ſurculis brevioribus, capſulis erectis.
Hiſpaniola.

pungens. 43–44. H. ſurculis confertis erectis teretibus ramoſis apice attenuatis acutis; foliol. lanceolatis ſubulatis patulis rigidiuſculis, pedunculis capillaribus brevibus.
Jamaica.

congeſtum. 44–45. H. ſurculis confertis ramoſis declinatis, ramis erectiuſculis apice inflexis, foliolis ſecundis ſubcapillaceis; pedunculis brevibus.
Jamaica.

tetragonum. 44-45. H. ſurculis repentibus, ramis vagis erectiuſculis tetragonis, foliol. 4-farie imbricatis concavis.
Jamaica.

torquatum. 44–45. H. ſurculis repentibus confertis, ramis erectis teretibus, foliol. ſiccitate ſpiraliter adpreſſis, calyptra coriacea baſi 5-partita.
Jamaica.

cirrhoſum. 44–45. H. ſurculis repentibus confertis, ramis ſubdiviſis, foliolis ſiccitate revolutis, capſulis globoſis, calyptris baſi multipartitis.
Jamaica.

ALGAE.

IUNGERMANNIA.

adianthoi- 1–2. I. frondibus erectis ſubdiviſis ſimpliciter pinnatis, foliolis obliquis ovatis ciliatis; fructificationibus terminalibus.
Jamaica.

criſta-

criſtata. 1–2. I. ſurculis repentibus, frondibus ramoſis erectis, foliolis lanceolatis acutis patentibus incumbentibus margine ſuperiore ſerratis, ſubtus lobis conniventibus criſtatis.
Jamaica.

proſtrata. 1–2. I. frondibus filiformibus reptantibus proſtratis ſimpliciuſculis, ſimpliciter pinnatis, foliolis alternis ovatis integris.
Jamaica.

pallens. 4–5. I. frondibus erectis ramoſis, foliolis ſimpl. pinnatis incumbentibus ſubrotundis integris, baſi ſemicordatis, perichætiis monophyllis retuſis infundibuliformibus.
Jamaica.

ſimplex. 4–5. I. ſurculis filiformibus repentibus, frondibus erectis ſimplicibus, foliolis ſimpl. pinnatis ovatis diſtantibus ſerrato-ciliatis fructific. terminalibus.
Jamaica.

perfoliata. 5–6. I. frondibus confertis erectis indiviſis, ſimpl. pinnatis, foliolis perfoliatis incumbentibus ſecundis ovatis integris.
Jamaica.

connata. 7–8. I. frondibus vagis ſimpl. pinnatis, foliol. oppoſitis incumbentibus apice retuſis ſubemarginatis poſtice connatis bidentulis; fructific. terminalibus, perichætio denticulato.
Jamaica.

tenera. 10–11. I. frondibus ſimpliciter pinnatis congeſtis repentibus, foliolis alternis diſtantibus ſubrotundis integris, auriculis ſubtus medio minutisſimis bifidis.
Jamaica.

ſerrulata. 11–12. I. ſurculis confertis erectis ſimpliciuſculis obtuſis ſupra 2-pinnatis, foliolis ſecundis ovatis concavis 2-fidis ſerratis, fructificationibus terminalibus, perichætio ſubulato.
Jamaica.

juni.

juniperoidea. 11–12. I. frondibus erectis ſimplicibus rigidis ſupra 2-pinnatis apice floriferis, foliis lanceolato-falcatis bifidis ſecundis.
Jamaica.

capillaris. 12–13. I. ſurculis repentibus ramoſis capillaribus ſupra bipinnatis, foliolis ſubimbricatis omnibus tripartitis.
Jamaica.

cupresſina. 12–13. I. frondibus procumbentibus confertis pennatis ſupra 2-pinnatis, foliolis imbricatis convexis 4-fidis.
Jamaica.

transverſalis. 16–17. I. frondibus transverſaliter repentibus duplicato-imbricatis, foliolis ſubrotundis integris.
Jamaica.

flava. 16–17. I. frondibus repentibus ramoſis duplicato-imbricatis, foliolis ſubrotundis, inferioribus minimis 2-fidis, perichætiis monophyllis retuſis.
Jamaica.

diffuſa. 16–17. I. frondibus dichotomis erectis duplicato-imbricatis (ſurculis ramoſisſimis,) foliolis ovatis convexis inferioribus ſubrotundis dentatis.
Jamaica, Hiſpaniola.

ſtolonifera. 16–17. I. frondibus erectis confertis ſubdiviſis duplicato-imbricatis, ſtolonibus reptantibus filiformibus, foliolis lanceolatis 3-dentatis ſecundis, inferioribus minimis ſubrotundis.
Jamaica.

brachiata. 16–17. I. frondibus erectis dichotomis duplicato-imbricatis, foliolis ovatis planis, inferioribus ſubrotundis convexis.
Jamaica.

atrata. 18–19. I. ſurculis ramoſisſimis pendulis capillaribus duplicato imbricatis; foliolis ovatis retuſis, inferioribus minutis cordatis bifidis.
Jamaica.

filiformis. 18–19. I. frondibus erectis filiformibus ſimpliciuſculis duplicato-imbricatis, foliolis ſubrotundis integris, inferioribus minutis.
Jamaica.

fili-

filicina. 19–20. I. ſurculis erectis ramoſis pennatis, pinnis linearibus duplicato-imbricatis, foliolis ovatis acutis ſerrulatis, inferioribus ſubemarginatis dentatis.
Jamaica.

tomentoſa. 20–21. I. ſurculis erectis confertis pennatis, pinnis duplicato-imbricatis, foliolis laciniatis tomentoſo-ciliatis, fructificationibus terminalibus ſolitariis.
Jamaica.

bifaria. 22–23. I. ſurculis erectis ſimpliciuſculis confertis bifariam imbricatis, foliolis ſubſecundis ovatis acutis denticulatis, fructificationibus terminalibus.
Jamaica.

ſinuata. 29–30. I. acaulis, fronde plana integra & pinnatifida ſinuata, lobis coadunatis obtuſis.
Jamaica.

fucoidea. 30–31. I. frondibus erectis ſupradecompoſitis, foliis oppoſitis, pinnis oppoſitis linearibus.
Jamaica.

2-pinnata. 31–32. I. acaulis, frondibus procumbentibus, ramoſa 2-pinnata; pinnis lacinulisque linearibus acutis.
Jamaica.

dichotoma. 32–33. I. acaulis, fronde lineari dichotoma erectiuſcula.
Jamaica.

linearis. 32–33. I. acaulis, fronde reptante lineari dichotoma divaricata.
Jamaica, Hiſpaniola.

polyphylla. 32–33. I. acaulis, frondibus congeſtis ſubrepentibus laciniatis palmatiſque, fructificationibus radicalibus.
Jamaica.

MARCHANTIA.

hirſuta. 1–2. M. calyce communi hemiſphærico 8-fido hirſuto.
Jamaica.

RICCIA.

reticulata. ? R. fronde difformi laciniata glabra reticulata.
Lichenoides gelatinoſ. tenue reticulatum. *Dill. muſc.* t. 19. f. 21.
Jamaica.

ANTHOCEROS.

criſpus. 2–3. A. frondibus ſinuatis laciniatis undulatis margine criſpis.
Jamaica.

LICHEN.

fungoides. 21–22. L. leproſus candidus, tuberculis ſtipitatis capitatis difformibus ſubcarneis, ſtipitibus longioribus.
Jamaica.

pannoſus. 24–30. L. cruſtaceus, ſubtus nigro-tomentoſus, ſuperne ſublobatus obſolete multifidus, ſcutellis convexis rufis.
Jamaica.

impreſſus. 30–31. L. cruſtaceus albicans, ſcutellis concavis atro-cærulefcentibus albo-marginatis. *Act. Scient. Upſ.* IV.
Jamaica.

goſſypinus. 31–32. L. cruſtaceus capillaceus mollis tomentoſus candidus; ſcutellis nigris margine albidis.
Jamaica.

pictus. 34–35. L. imbricatus, foliolis multifidis ſinuatis adnatis centrifugis albidis; ſcutellis atris albo-marginatis.
Jamaica.

Cocoës. 45–46. L. imbricatus; foliolis adnatis ſinuatis candidis, ſcutellis parſis atris.
Jamaica.

damæcornis. 52–56 L. foliaceus; multipartito-dichotomus glaber, apicibus bifidis, ſubtus tomentoſus, peltis marginalibus.
Jamaica.

laci-

laciniatus. 52-53. *L.* foliaceus, depresſus rigidus, irregularis laciniatus inciſus glaber ſubtus tomentoſus.
Jamaica.

flavicans. 57-58. L. foliaceus, lineari-teretiuſculus ramoſus fulvus, ſcutellis planis marginalibus concoloribus. Uſnea, *Brown. jam.* 80. 2.
Jamaica.

cerotophyllus. 58–59. L. foliaceus rectus laciniatus, foliolis obtuſis cornigeris.
Jamaica.

diaphanus. 59–60. L. foliaceus, membranaceo-pellucidus cæruleſcens tenerrimus laciniatus plicato-undulatus, laciniis criſpatis; ſcutellis ſparſis ferrugineis.
Jamaica.

marginellus. 59–60. L. foliaceus, membranaceo-pellucidus lobatus plicato-undulatus, ſcutellis marginalibus minutis ferrugineis albo-marginatis.
Jamaica.

veſiculoſus. 59–60. L. foliaceus, membranaceo-pellucidus lobatus undulatus veſiculoſus, veſiculis turbinatis inferne apertis, apice ſcutelligeris, ſcutellis convexis rufis.

disſectus. 66–67. L. foliaceus, depresſus laciniato-lobatus, (junior multifidus) obtuſus lævis utrinque albidus, peltis concavis ſparſis.
Jamaica.

tomentoſus. 67–68. L. foliaceus, depresſus, membranaceus rotundatus inciſo-lobatus lævisſimus, lobis 2-fidis, inferne villoſo-tomentoſus.
Jamaica.

aggregatus. 106–107. L. fruticuloſus, perforatus ramoſisſimus, ramulis erectis, tuberculis granuloſis aggregatis terminalibus.
Jamaica.

melanocarpus. 109–110. L. fruticuloſus, ſolidus ramoſus albidus, ramulis foliolisque compresſis, tuberculis globoſis depresſis atro-tomentoſis.
Jamaica.

ramuloſus. 111–112. L. fruticuloſus, ſolidus tectus; ramoſus, foliolis filamentoſis, tuberculis globoſis ſolidis terinalibus.
Jamaica.

 FUCUS

FUCUS.

trifarius. 27–28. F. fronde triquetra ramoſa, foliis trifariis apice bifidis. *Fucus triqueter*, Gmel. fuc.
Jamaica.

ULVA.

montana. 1–2. U. plana reniformis ſeſſilis aggregata zonata ſubtus incana.
Montes cærulea Jamaicæ.

BYSSUS.

ſanguinea. 6–7. B. capillacea velutina perennis coccinea cortici adnaſcens.
Jamaica.

FUNGI.

AGARICUS.

ſtriatus. 38–39. A. acaulis, convexus ferrugineus pubeſcens, margine integro, lamellis alternis interruptis cinereis.
Jamaica.

radiatus. 38–39. A. acaulis flabelliformis albidus villoſus, margine inciſo-crenato; lamellis concoloribus.
Jamaica.

BOLETUS.

membranaceus. 8–9. B. acaulis gregarius proliferus ſubmembranaceus lævis radiatus albus, poris eroſis difformibus.

villoſus. 2–7 B. acaulis, ſubmembranaceus faſciatus griſeo-albidus villoſus, poris difformibus dentatis.
Jamaica.

hydnoi-

hydnoides. 2–3. B. acaulis craſſus ſetis ramoſis erectis denſis nigris ſuperne tectus, poris tenuiſſimis teretibus.
Jamaica.

faſciatus. 2–3. B. acaulis durus ſuperne inæqvalis fuſcus nigro-faſciatus, poris albidis tenuiſſimis.
Jamaica.

reſupinatus. 7–8. B. acaulis reſupinatus ſubtus glabriuſculus albus, ſuperne poris impalpabilibus fuſcis.
Jamaica.

microporus. 7–8. B. acaulis ligneus durus difformis inæqvalis, poris inæqvalibus impalpabilibus pallidis. Poria 4. *Brown. jam.* 77.
Jamaica.

HYDNUM.

agaricoides. 7. H. acaule convexum læve pallidum, ſubtus ferugineum.
Jamaica.

reſupinatum. 8. H. acaule planum imbricatum ſubtus ſcabrum, ſupra ſetis ramentaceis ferrugineis tectum.
Jamaica.

ſericeum. 9. H. acaule imbricatum planum, textura molli, utrinque ſericeum exalbido-vireſcens.
Jamaica, Hiſpaniola.

HELUELLA.

verſicolor. 3. H. acaulis membranacea faſciis diſcoloribus, inferne lævis alba.
Jamaica.

tremellina. 4. H. acaulis coriacea undulata lævis plumbea, ſubtus incano-villoſa.
Jamaica.

atrata. 5. H. acaulis membranacea fragilis utrinque lævis, nigra.
Jamaica.

pallida. 6. H. acaulis coriacea fragilis utrinque lævis, ſuperne fuſca, inferne albeſcens.
Jamaica.

PEZIZA.

nigreſcens. 6–7. P. globoſo-campanulata obliqva, intus glabra atra extus incano-villoſa; margine integro.
Jamaica.

flava. 6–7. P. globoſo-campanulata obliqva, intus pubeſcens extus glaberrima, utrinque flava; margine integro.
Jamaica, Hiſpaniola.

CLAVARIA.

fuſca. 2–3. C. cæſpitoſa fuſca, caulibus ſubſimplicibus compresſis baſi coalitis tomentoſis, apice interdum furcatis.
Hiſpaniola.

ADDEN-

ADDENDA & CORRIGENDA.

p. 12. poſt CYNOMORIUM *jamaicenſ.*

coccineum. 1. C. *ſtipite ſqvamoſo, amento cylindraceo, ſqvamis imbricatis ovatis retuſis.*
Cynomorium *Linn. Mich.*

p. 15. poſt THOUINIAM *liguſtrinam*:

nutans. 1. T. *foliis ellipticis, paniculis axillaribus, floribus nutantibus.* T. nutans *Linn.*

p. 29. poſt DIODIAM *ſimplicem*:

virginica. 1. D. *caule ramoſo procumbente lævi.*
Diodia virginica. *Linn.*

p. 31. poſt ÆGIPHILAM *elatam*:

martinicenſis. 1. AE. *foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, ramis diffuſis, paniculis terminalibus axillaribusve, calycibus glabris.* AE. martinicenſis *Linn.* Jacq.

p. 32. poſt SAMARAM *coriaceam*:

læta. 1. S. *floribus confertis pedicellatis, foliis ovatis obtuſis.* S. læta. *Linn.*

p. 50. poſt ITEAM *Cyrillam*:

virginica. 1. I. *foliis ovatis acutis ſerratis.* Itea virginica. *Linn.*

p. 51. poſt HIRTELLAM *paniculatam*:

americana. 1. H. *foliis ovato-lanceolatis, ramulis hirſutis, racemis erectis ſimplicibus, floribus 5-dris.* H. americana *Linn.*

p. 58. exclude *Cocoem acicularem*, quæ eſt Bactris minor Jacq. 1. Cocos guienenſis. *Linn.* Ejus loco inſeritur:

aculeata. 3. C. aculeato-ſpinoſa, caudice fuſiformi, frondibus pinnatis, ſtipitibus ſpathisque ſpinoſis. Cocos aculeatus. *Jacq. am.* 278. t. 179. ?
Palma pinnis & caudice ubique aculeatiſſimis fructu majuſculo. *Brown. jam.* 344. 7.
Palma tota ſpinoſa major. *Sloan.* h. 2. 119. t. 214.
Jamaica, Hiſpaniola. ♄.

p. 59. poſt GUETTARDAM *rugoſam*:

ſpecioſa. 1. G. *foliis cordatis lato-ovatis ſubſericeis, floribus ſubhexandris, tubo elongato.* G. ſpecioſa. *Linn.*

p. 75. poſt TRIOPTERIDEM *rigidam*:

jamaicenſis. 1. T. *foliis oblongis acuminatis venoſis nitidis, racemis compoſitis terminalibus laxis, capſulis 3-alatis.*
T. jamaicenſis. *Linn.*

---

p. 21. lin. 26. *loco* Paſpatum *leg.* Paſpalum.
22. — 2. *loco* ſubſolitaris *leg.* ſubſolitari.
31. — 1. *loco* Triandria *leg.* Tetrandria.
31. — 27. *loco* AEEgiphila *leg.* AEgiphila.
62. — 4. *loco* Alophyllus *leg.* Allophylus.

IN-

INDEX.

Columna prior numerum ſpecierum, poſterior paginam indicat.

A.

Acalypha	9.	99.
Achania	2.	102.
Achyranthes	1.	51.
Acidoton	1.	83.
Acroſtichum	8.	128.
Adianthum	10.	134.
Aegiphila	3.	31.
Aeſchynomene	1.	107.
Agaricus	2.	148.
Agroſtis	1.	25.
Alchemilla	1.	38.
Alchornea	1.	98.
Allophylus	3.	62.
Alpinia	1.	11.
Althæa	2.	101.
Amomum	1.	11.
Amerimnon	2.	104.
Ammannia	1.	33.
Anagallis	1.	40.
Andromeda	3.	73.
Andropogon	3.	26.
Anthoceros	1.	146.
Apeiba	4.	83.
Aralia	2.	55.
Ardiſia	5.	46.
Argythamnia	1.	39.
Ariſtolochia	2.	126.
Aſclepias	1.	53.
Aſplenium	8.	129.
Ayenia	1.	97.

B.

Baniſteria	1.	75.
Bauhinia	1.	66.
Begonia	2.	86.
Bellonia	1.	42.
Bidens	1.	110.
Bignonia	3.	91.
Boehmeria	5.	34.
Boletus	6.	148.
Bromelia	2.	56.
Broſimum	2.	12.
Brunfelſia	1.	90.
Bryonia	1.	116.
Bryum	5.	139.
Buchnera	1.	92.
Bumelia	7.	50.
Byſſus	1.	148.

C.

Cacalia	1.	110.
Cactus	2.	77.
Calea	1.	113.
Callicarpa	2.	31.
Calyptranthes	3.	79.
Capparis	2.	81.
Camocladia	1.	17.
Cardioſpermum	1.	64.
Carex	1.	18.
Carolinea	1.	101.
Caſſia	3.	66.

Catesbæa	1.	30.
Celtis	3.	55.
Cenchrus	1.	26.
Cephaëlis	4.	45.
Ceſtrum	1.	49.
Chionanthus	2.	13.
Chloris	5.	25.
Chryſophyllum	3.	49.
Cinchona	3.	41.
Cineraria	2.	113.
Citharexylon	3.	91.
Clavaria	1.	150.
Clethra	1.	74.
Clinopodium	1.	88.
Clitoria	1.	106.
Coccoloba	1.	64.
Coccoſipſilum	1.	31.
Cocos	1.	151.
Columnea	3.	93.
Conyza	2.	112.
Cordia	2.	47.
Coſtus	2.	11.
Cranichis	5.	120.
Crantzia	1.	38.
Croton	9.	100.
Cupania	3.	61.
Cynanchum	2.	52.
Cynomorium	2.	12.
Cyperus	4.	20.

D.

Daphne	3.	63.
Dichondra.	1.	54.
Diodia	4.	29.
Dioſpyros	1.	62.
Dolichos	2.	105.
Dorſtenia	1.	34.

E.

Echites	4.	52.
Eclipta	1.	114.
Ehretia	1.	47.
Elephantopus	2.	115.
Epidendrum	49.	120.
Epigea	1.	73.
Erigeron	1.	113.
Ernodea	1.	29.
Eroteüm	2.	85.
Erythroxylon	1.	75.
Ethulia	1.	111.
Eupatorium	7.	111.
Euphorbia	3.	76.
Evolvolus	1.	55.

F.

Fagara	4.	33.
Ficus	1.	127.
Fontinalis	5.	138.
Fuchſia	1.	62.
Fucus	1.	144.

G.

Galega	1.	108.
Gardenia	3.	51.
Geoffræa	1.	106.
Geſneria	9.	89.
Glycine	2.	105.

Gnapha-

Gnaphalium 2. 112.
Gratiola 1. 14.
Guettarda 3. 59.
Gymnanthes 2. 95.

H.

Hamellia. 4. 46.
Hedera. 2. 51.
Hedwigia 1. 62.
Hedyoſmum 2. 84.
Hedyotis 1. 29.
Hedyſarum 8. 106.
Helicteres 1. 98.
Heliotropium 1. 40.
Helvella 4. 149.
Hemionitis 1. 129.
Hepetis 1. 56.
Hibiſcus 1. 102.
Hillia 1. 58.
Hippocratea 1. 17.
Hirtella 2. 51.
Hoffmannia 1. 30.
Holoſteum 1. 27.
Homalium 2. 86.
Hydnum 3. 149.
Hydrocotyle 1. 54.
Hydrolea 1. 54.
Hypnum 27. 140.

I.

Iacquinia 1. 47.
Iatropha 1. 98.
Itea 1. 50.
Iungermannia 28. 143.
Iuſticia 7. 13.
Ixora. 2. 30.

K.

Kyllinga 1. 20.

L.

Labatia 1. 32.
Laciſtema 1. 12.
Laetia 2. 83.
Lantana 2. 92.
Laugeria 2. 48.
Laurus 9. 65.
Lavenia 1. 112.
Leerſia 2. 21.
Legnotis 2. 84.
Lichen 18. 146.
Lightfootia. 1. 83.
Limodorum 2. 119.
Lindernia 1. 92.
Lippia 1. 92.
Liſianthus 4. 40.
Lithophila 1. 14.
Lobelia 1. 117.
Loranthus 3. 58.
Ludwigia 1. 33.
Lycopodium 4. 137.
Lythrum 2. 76.

M.

Magnolia 1. 87.
Malaxis 2. 119.
Malpighia 3. 74.

Manettia 1. 37.
Maniſuris 1. 25.
Marattia 1. 128.
Marchantia 1. 145.
Marila 1. 84.
Matricaria 1. 114.
Melampodium 1. 114.
Melaſtoma 36. 68.
Melia 1. 67.
Melochia 3. 97.
Microtea 1. 53.
Mi ium 4. 24.
Mimoſa 6. 85.
Mnium 3. 139.
Myginda 2. 39.
Myriſtica 2. 96.
Myrodia 2. 102.
Myrtus 16. 77.

O.

Ochna 1. 67.
Ochroma 1. 97.
Olyra 1. 21.
Omphalea 2. 95.
Orchis 1. 118.
Oſmunda 4. 127.

O.

Panax 1. 54.
Panicum 19. 22.
Paſpalum 4. 21.
Pasſiflora. 3. 97.
Paulinia 2. 64.
Pectis 1. 114.
Petaloma 2. 73.
Peziza 2. 150.
Phlomis 1. 88.
Phyllanths 3. 27.
Picramnia 1. 27.
Pinus. 1. 103.
Piper 17. 15.
Piſonia 2. 60.
Poa 2. 26.
Polypodium 31. 130.
Polytrichum 1. 139.
Pontederia 2. 57.
Portlandia 1. 48.
Posſira 2. 81.
Pothos 2. 38.
Prinos 2. 58.
Prunus 2. 80.
Pſidium 2. 77.
Pſychotria 23. 42.
Pteris 3. 129.

Q.

Quasſia 1. 67.

R.

Rayania 2. 59.
Rhamnus 2. 50.
Rhexia 2. 61.
Riccia 1. 146.
Robinia 1. 106.
Rochefortia 2. 53.
Rolandra 1. 116.

Ron-

Rondeletia	8.	41.
Ruellia	3.	93.
Ruyſchia	2.	50.

S.

Sabicea	2.	46.
Sacharum	1.	21.
Salvia	2.	14.
Samara	1.	32.
Samyda	4.	68.
Satyrium	5.	118.
Schæfferia	2.	38.
Schoenus	10.	19.
Scleria	6.	18.
Scutellaria	1.	89.
Securidaca	1.	104.
Serapias	2.	119.
Sicyos	1.	116.
Sida	4.	101.
Siſyrinchium	1.	17.
Sloanea	2.	82.
Smilax	1.	59.
Solandra	1.	42.
Solanum	3.	47.
Sonchus	1.	110.
Sophora	1.	66.
Spermacoce	1.	29.
Spilanthus	1.	110.
Stachys	1.	88.
Staphylea	1.	55.
Sterculia	1.	98.
Styloſanthes	2.	108.
Styrax	1.	74.
Symplocos	1.	109.

T.

Tabernæmontana	1.	52.
Tamonea	2.	94.
Tanæcium	2.	91.
Teramnus	2.	105.
Terminalia	2.	68.
Ternſtrômia	3.	81.
Tetranthus	1.	115.
Teucrium	1.	88.
Thouinia	1.	14.
Thrinax	1.	57.
Thymus	1.	89.
Tillandſia	5.	56.
Tournefortia	1.	40.
Tradeſcantia	5.	57.
Trichilia	3.	67.
Trichomanes	14.	136.
Triopteris	2.	75.
Triumfetta	2.	76.
Trixis	3.	115.
Tusſilago	2.	113.

U.

Ulva	1.	148.
Urtica	22.	35.
Utricularia	1.	14.
Uvaria	1.	87.

V.

Vaccinium	1.	62.
Valentinia	1.	63.
Varronia	1.	48.

Ver-

INDEX.

Verbeſina	1.	114.
Viburnum	1.	54.
Viola	1.	117.
Viſcum	1.	32.
Vitex	2.	59.

W.

Wallenia	1.	31.
Weinmannia	1.	63.

X.

Xiphidium	1.	17.
Xylophylla	4.	28.

HOLMIÆ,

Typis And. Jac. Nordström.

MDCCLXXXVIII.

1,50

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00634 6795